NO 1024　レジメン名　VNB（2投1休）

病棟　患者番号　氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
				～	

年齢	身長	体重	体表面積	GFR（血清ｸﾚｱﾁﾆﾝ値）
歳	cm	kg	㎡	ml/min （mg/dl）

【適応がん種】NSCLC　VNB

1・ロゼウス　20～25 mg/㎡　DAY1.8

21日（3週）1クール

CCr補正	GOT補正	T-Bil補正
－	－	－

WBC基準	HGB基準	PLT基準
2000	－	－

【病状】
1　全て説明している
2　病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない
3　未告知である

【治療】
1　抗癌剤による治療・予防と説明
2　抗癌剤とは言わず治療薬と説明
3　抗癌剤とは言わず予防薬と説明
4　薬に関しては説明していない

平成20年7月1日　改訂

NO	薬品1	規格	本数	薬品2（規格本数）	時間・投与法
①	グラニセトロン1mg		1　本	5%ブドウ糖100mL	ロゼウス投与前少量流し、正確に血管確保されている事を確認する ↓ ②ロゼウス終了後、速やかに30分かけて点滴
②	ロゼウス（　　）mg	10mg	本	★5%ブドウ糖50mL	全開で側注

【延期基準】 ⇒ 白血球2000未満

【看護師注意事項】 ⇒ 静脈炎発症し易い薬剤にて可能な限り下記の点に留意する

1. ロゼウス投与終了後は速やかに5%ブドウ糖を点滴すること（薬液を血管内に滞留させないため）
2. 可能な限り前化学療法で使用されていない血流の良い太い血管を選択する。手の甲、関節などの可動部は避ける

202201更新

月日			指示		指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
			①②	DAY1									
			①②	DAY8									
			休み	DAY15									