

NO 1028		レジメン名		GEM/CBDCA								
病棟 患者番号 氏名		癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名						
		年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)						
		歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)						
【適応がん種】 NSCLC		GEM/CBDCA		CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年8月1日 改訂					
1・ゲムシタビン 1000 mg/m ² DAY1. 8				-	-	-						
2・カルボプラチン AUC6 DAY1 【カルバトートの式: CBDCA量(mg) = (GFR+25) × AUC】				カルバート使用	-	-						
21日(3週)1クール				WBC基準 2000	HGB基準 -	PLT基準 70000						
NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法								
① パロノセトロンバッグ		1 本										
② デキサメタゾン 6.6mg		1 本	生食100mL	30分で点滴								
③	デキサメタゾン 6.6mg	1 本	生食100mL	30分で点滴								
	グラニセトロン 1mg	1 本										
④	ゲムシタビン()mg	1000mg	5%ブドウ糖100mL	①デキサメタゾン終了後～ 必ず30分で点滴								
		200mg										
⑤	カルボプラチン()mg	450mg	▲5%ブドウ糖250mL	②ゲムシタビン終了後～ 1時間で点滴								
		150mg										
		50mg										
⑥ 生食50mL		1 本		DAY1③終了後～ DAY8②終了後～ 全開で点滴								
【DAY8延期基準】 <input type="checkbox"/> 白血球2000未満、血小板75000以下で中止考慮												
【減量基準】 <input type="checkbox"/> 白血球1000未満、好中球500未満、血小板20000以下で CBDCA AUC 5→4～4.5 への減量考慮 GEM 1000 → 800 mg/m ² への減量考慮												
202201改訂												
月日	指示			指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①② ④⑤⑥ DAY1											
	③④ ⑥ DAY8											