

NO 1034		レジメン名		IP(裏面あり)							
病棟 患者番号 氏名		癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名					
		年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)					
		歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)					
【適応がん種】MK		CPT-11/CDDP		CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂				
1・イリノテカン	70 mg/m ²	DAY1. 15		60~	-	-					
2・シスプラチン	80 mg/m ²	DAY1		60~禁30	180~	3.1~禁5.1					
28日(4週)1クール				WBC基準	HGB基準	PLT基準					
				3000	-	100000					
NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法							
① アプレピタント125mg内服											
② パロノセトロンバッグ		1 本		アプレピタント内服後~全開							
③ デキサメタゾン 6.6mg		1.5 本									
③ アスパラギン酸カリウム		2 本	デノサリン500mL	1時間で点滴							
③ 硫酸マグネシウム		1 本									
④ イリノテカン()mg	100mg	本	5%ブドウ糖500mL	デキサメタゾン終了後							
	40mg	本		1時間30分で点滴							
⑤ マンニトール 300mL		1 本		イリノテカン終了後~							
				30分で点滴							
⑥ シスプラチン()mg	50mg	本	【生食250mL】	マンニトール終了後~							
	25mg	本									
	10mg	本									
⑦ ヴィーンF500mL		1 本		シスプラチン終了後~							
				1時間で点滴							
⑧ ヴィーンF500mL		1 本		ヴィーンF終了後~							
				1時間で点滴							
⑨ デノサリン500mL		1 本		ヴィーンF終了後~							
				1時間で点滴							
⑩ パロノセトロンパック		1 本		全開で点滴							
⑪ デキサメタゾン 6.6mg		1 本	生食50mL	15分で点滴							
⑫ イリノテカン()mg	100mg	本	ソルデム3A500mL	1時間30分で点滴							
	40mg	本									
⑬ 生食50mL		1 本		⑩イリノテカン終了後~							
				全開で点滴							
月日		指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
		①~⑨	DAY1								
		⑩⑪⑫⑬	DAY15								

医師指示表			
月日	指示事項	指示者名	受領者名
	シスプラチン投与日 1日2回 尿量測定		
	①レジメンの点滴開始からの5時間 ②その後の5時間		
	↓		
	CDDP当日.....上記5時間の尿量が500mL以下の場合ラシックス40mg1錠内服		

★院内セットメニュー 【高度催吐性リスクレジメン】					
	DAY 2~4(翌日から内服)				
	デカドロン(0.5mg)	16錠	分2~分3	3日分	
	アプレピタント(80mg)	1Cap	朝食後	2日分	
	吐気時(必要に応じて処方)				
	メクロプラミド錠	1回2錠	10回分(1日3回まで)		