

NO 1037		レジメン名		VP-16/CBDCA								
病棟 患者番号 氏名		癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名						
		年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)						
		歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)						
【適応がん種】 SCLC		CBDCA/VP-16		CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】					
1・カルボプラチン AUC4~4.5 DAY1 【カルバートの式: CBDCA量(mg)=(GFR+25)×AUC】				カルバート使用	-	-	1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である					
2・エトポシド 100 mg/m ² DAY1. 2. 3 または DAY1. 3. 5				60~	60~禁180	1.5~禁3.1	【治療】					
21~28日(3~4週)1クール				WBC基準	HGB基準	PLT基準	1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年8月1日 改訂					
NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与法						
①	アロキシバック		1 本			全開で点滴						
②	デキサメタゾン 6.6mg		1.5 本	生食50mL		15分で点滴						
③	カルボプラチン「NK」()mg	450mg	本	生食500mL		デキサート終了後~ 2時間で点滴						
		150mg	本									
		50mg	本									
④	エトポシド()mg	100mg	本	5%ブドウ糖500mL		カルボプラチン終了後~ 2時間で点滴						
⑤	生食50mL		1 本			エトポシド終了後~ 全開で点滴						
⑥	デキサメタゾン 6.6mg		1 本	生食50mL		15分で点滴						
⑦	エトポシド()mg	100mg	本	5%ブドウ糖500mL		デキサート終了後~ 2時間で点滴						
⑧	生食50mL		1 本			エトポシド終了後~ 全開で点滴						
【看護師注意事項】												
○点滴セットはJMS社製JY-PFC341F7を使用												
★11万円/28日1クール				★4時間30分/2時間30分/2時間30分				200807更新				
月日	指示			指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
		①②③④⑤	DAY1	DAY1								
		⑥⑦⑧	DAY2	DAY3								
		⑥⑦⑧	DAY3	DAY5								