

NO 1039 レジメン名 WeeklyPTX-CBDCA(肺がん)

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)	
歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)	

【適応がん種】NSCLC	PTX/CBDCA	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年8月1日 改訂
1・パクリタキセル 70 mg/m ² DAY1. 8. 15		-	-	-	
2・カルボプラチン AUC6 DAY1 【カルバートの式: CBDCA量(mg) = (GFR+25) × AUC】	カルバート使用	-	-		
★アルコール含有説明要 28日(4週)1クール	WBC基準	HGB基準	PLT基準		

NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
--------	----	----	-----------	--------

① レスタミンコーワ5錠 内服 (前投与 オーダー不要)				② デキサメタゾンと同時に内服
デキサメタゾン 6.6mg DAY1→		3 本		
② ファモチジン20mg DAY8. 15→		1.5 本	★生食50mL	①レスタミンコーワと同時に15分で点滴
③ グラニセトロン1mg (day1はパロノセトロンバック)		1 本	生食100mL	②デキサメタゾン終了後～30分で点滴
④ パクリタキセル()mg	100mg	本	▲5%ブドウ糖250mL	③グラニセトロン終了後～1時間で点滴
	30mg	本		
⑤ カルボプラチン()mg	450mg	本	5%ブドウ糖500mL	④パクリタキセル終了後～1時間30分で点滴
	150mg	本		
	50mg	本		
⑥ 生食50mL		1 本		④パクリタキセル又は⑤カルボプラチン終了後～全開で点滴

【看護師注意事項】
○点滴セットはJMS社製JY-PFC341F7を使用

月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①②③④⑤⑥ DAY1									
	①②③④ ⑥ DAY8									
	①②③④ ⑥ DAY15									
	休み DAY22									