

NO 1047 レジメン名 **BV+PTX(Weekly)/CBDCA**

病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
			年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)
			歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)

【適応がん種】NSCLC(扁平上皮を除く)	PTX/CBDCA/BV	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成22年2月2日 改訂
1・パクリタキセル 70 mg/m ² DAY1. 8. 15		-	-	-	
2・カルボプラチン AUC6 DAY1		カルバート使用	-	-	
【カルバートの式: CBDCA量(mg)=(GFR+25)×AUC】					
3・ペバシズマブ 15 mg/kg DAY1		-	-	-	
★アルコール含有説明要		WBC基準	HGB基準	PLT基準	
28日(4週)1クール		-	-	-	

NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
①	レスタミンコーワ5錠	内服	(前投与 オーダー不要)	②デカドロンと同時に内服

②	デキサート 6.6mg	DAY1→ DAY8. 15→	3 本 1.5 本 1 本	★生食50mL	①レスタミンコーワと同時に15分で点滴
③	グラニセトロン「NK」1mg (day1はアロキシバック)		1 本	生食100mL	②デキサート終了後～30分で点滴
④	パクリタキセルNK()mg	100mg 30mg	本 本	▲5%ブドウ糖250mL	③終了後～1時間で点滴
⑤	カルボプラチン「NK」()mg	450mg 150mg 50mg	本 本 本	5%ブドウ糖500mL	④パクリタキセル終了後～1時間30分で点滴
⑥	生食50mL		1 本		④パクリタキセル又は⑤カルボプラチン終了後～全開で点滴
⑦	ペバシズマブ()mg	400mg 100mg	本 本	生食100mL	⑥生食終了後～主・1時間30分で点滴
⑧	生食50mL		1 本		⑦ペバシズマブ終了後～主・全開で投与

【1. 原則禁忌】
●脳転移患者(脳出血のおそれ), 喀血(2.5mL以上の鮮血)既往患者

【2. 投与前必須検査】
●投与前・後に血圧測定 BP180/120を超える場合は主治医へ報告
●ペバシズマブ検査セット(●血液算定●T-Bil●GOT●GPT●ALP●ALB●Scr●CRP●尿蛋白測定●PT-INR●APTT●フィブリノーゲン●D-ダイマー)

【看護師注意事項】
○点滴セットはJMS社製JY-PFC341F7を使用

★67万円/28日1クール				★5時間/1時間45分/1時間45分				202104更新		
月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①②③④⑤⑥⑦⑧	DAY1								
	①②③④ ⑥	DAY8								
	①②③④ ⑥	DAY15								
	休み	DAY22								

外来 ・ 入院

指示日; 年 月 日

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--