

NO 1048		レジメン名		BV (maintenance)			
病棟 患者番号 氏名		癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名	
		年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)	
		歳	cm	kg	m <sup>2</sup>	ml/min (mg/dl)	
【適応がん種】NSCLC(扁平上皮を除く)				BV	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正
1 ベバシズマブ 15 mg/kg DAY1				-	-	-	
No.147 6クール後の維持療法としてPDまで継続							
21日(3週)1クール				WBC基準	HGB基準	PLT基準	
				-	-	-	
NO 薬品1		規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与法	
① 生食50mL			1 本			全開で投与	
② ベバシズマブ( )mg		400mg	本	生食100mL		1時間30分で点滴	
		100mg	本				
③ 生食50mL			1 本			ベバシズマブ終了後～全開で投与	
<p>【1. 原則禁忌】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●脳転移患者(脳出血のおそれ), 喀血(2.5mL以上の鮮血)既往患者</li> </ul> <p>【2. 投与前必須検査】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●投与前・後に血圧測定 BP180/120を超える場合は主治医へ報告</li> <li>●アバチン検査セット</li> </ul> <p>(●血液算定●T-Bil●GOT●GPT●ALP●ALB●Scr●CRP●尿蛋白測定●PT-INR●APTT●フィブリノーゲン●D-ダイマー)</p>							
202201改訂							
月日	指示			指示医	受け	監査	払い
	①②③ DAY1						
<p>ベバシズマブ投与 リスク患者:</p> <p>1) 消化管など腹腔内の炎症を合併(消化管穿孔のおそれ) 2) 大きな手術の術創が治癒していない(創傷治癒遅延による合併症)</p> <p>3) 先天性出血素因、凝固系異常のある患者(出血のおそれ) 4) 抗凝固剤投与中の患者(出血のおそれ)</p> <p>5) 血栓塞栓既往患者(心筋梗塞、脳梗塞、深部静脈血栓症、肺塞栓症のおそれ)</p> <p>6) 高血圧患者(悪化のおそれ) 7) 高齢者(重大な副作用が現れやすい)</p> <p>8) 妊婦、授乳婦(動物実験で催奇形性、授乳中に移行)</p>							