

NO 1060		レジメン名		nabPTX+CBDCA+Pembro			
病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
						~	
			年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)
			歳	cm	kg	m <sup>2</sup>	ml/min (mg/dl)

【適応がん種】肺扁平上皮癌	Pembro/nabPTX/CBDCA	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂
1・ペムブロリズマブ 200 mg/body DAY1					
2・アブラキサン 100 mg/m <sup>2</sup> DAY1. 8. 15 1段階減量 75 mg/m <sup>2</sup> 2段階減量 50 mg/m <sup>2</sup>					
3・カルボプラチン AUC6 DAY1 【カルバートの式: CBDCA量(mg) = (GFR+25) × AUC】					
21(3週)1クール		WBC基準	HGB基準	PLT基準	

NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
①	生理食塩水		1 本	50mL	15分
②	キイトルーダ	200mg	1本	★生食100mL	30分で点滴
③	生理食塩水		1 本	50mL	5分で点滴(フラッシュ)
④	パロノセトロンバック		1 本		全開で点滴
⑤	デキサメタゾン 6.6mg		1 本	生食50mL	15分で点滴
⑥	アブラキサン( )mg	100mg	本	生食 mL (100mgあたり20mL)	デキサート終了後～ 30分で点滴
⑦	生食50mL		1 本		アブラキサン終了後～ 全開で点滴
⑧	カルボプラチン( )mg	450mg	本	5%ブドウ糖500mL	④生食終了後～ 1時間30分で点滴
		150mg	本		
		50mg	本		
⑨	生食50mL		1 本		カルボプラチン終了後～ 全開で点滴

【看護師注意点】  
キイトルーダ: インラインフィルター(0. 2～5 μm)を使用すること。  
アブラキサン: 口禁止!! 強く振らない・インラインフィルター付輸液セット(PVCフリー)を使用しない!

【薬剤師注意点】  
アブラキサン: 調整後、ロット入力実施。  
クール数 4C 5C以降はNo159を3週ごとに繰り返し、維持療法を行う。

月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ DAY1									
	④⑤⑥⑦ DAY8									
	④⑤⑥⑦ DAY15									