

NO 1064		レジメン名		Niv+IPI+PEM/CBDCA			
病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
						~	
			年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)
			歳	cm	kg	m <sup>2</sup>	ml/min (mg)
【適応がん種】 NSCLC(非扁平上皮)			Niv/IPI/PMT/CBDCA		CCr補正	GOT補正	T-Bil補正
1・ニボルマブ	360	mg/body	DAY1.22				【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年8月1日 改訂
2・イピリムマブ	1	mg/kg	DAY1				
3・ペトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	DAY1.22				
4・カルボプラチン	AUC5~6		DAY1.22				
【カルバートの式: CBDCA量(mg)=(GFR+25)×AUC】				カルバート使用	-	-	
42日(6週)1クール 最大1コース				2コース目以降は	WBC基準	HGB基準	PLT基準
Niv+Ipiのみ(No.1065or1066)				4000	-	-	
NO 薬品1		規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与法	
①		パンビタン末 1g 1日1回		ペトレキセド投与7日前より最終投与から22日目まで連日投与			
①		メチコパール注(500μg) 2A 筋注		ペトレキセド投与7日前より最終投与から22日目まで9週毎に投与			
		オーダー(処方箋)で投薬					
②	生理食塩水		1 本	50mL		15分	
③	オプジーボ( )	240mg	1 本	★生食100mL		30分以上で点滴	
		120mg	1 本				
④	生理食塩水		1 本	50mL		30分で点滴	
⑤	ヤーポイ( )mg	50mg	本	★生食 20mL (生食50mL→30mL破棄)		30分で点滴	
				25kg以下は生食20mLでは適応濃度以下になるため、1mg/mLになるように計算			
⑥	生理食塩水		1 本	50mL		30分で点滴	
⑦	デキサート 6.6mg		1.5 本	★生食50mL		全開で点滴	
⑧	ペトレキセド( )mg	500mg	本	生食100mL		⑦デキサート終了後～10分間で点滴	
		100mg	本				
⑨	パロノセトロンバック		1 本			⑧ペトレキセド終了後～30分で点滴	
⑩	カルボプラチン( )mg	450mg	本	5%ブドウ糖500mL		⑨パロノセトロン終了後～1時間30分で点滴	
		150mg	本				
		50mg	本				
⑪	★生食50mL		1 本			⑩カルボプラチン終了後～全開で点滴	



2018/8/21より240mg/body 30分以

ヤーボイ 1~4mg/mLの濃度で希釈。

生食20mL+ヤーボイ必要液量で  
25kg~231kgまでは1~4mg/mL の範囲内。  
その範囲外の体重では濃度・希釈液量再計算  
が必要。 20190823 澤井

