

NO 1071		レジメン名		ABCP			
病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
年齢		身長		体重		体表面積	
歳		cm		kg		m ²	
						ml/min (mg/dl)	
【適応がん種】NSCLC(非扁平上皮)			ATEZO/BV/PTX/CBDCA		CCr補正	GOT補正	T-Bil補正
1・アテゾリズマブ 1200 mg/body DAY1 (テセントリク点滴静注)							
2・ベバシズマブ 15 mg/kg DAY1							
3・パクリタキセル 175 mg/m ² DAY1							
4・カルボプラチン AUC6 DAY1 【カルバートの式: CBDCA量(mg) = (GFR+25) × AUC】					カルバート使用		
★アルコール含有説明要			4~6コース目以降は		WBC基準	HGB基準	PLT基準
21日(3週)1クール 最大6コース			ATEZO+BVのみ(No.1072)		4000		
NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法		
①	生理食塩水		1 本	50mL	全開で点滴		
②	テセントリク()	1200mg	1 本	★生食250mL	1時間で点滴 (2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能)		
③	生理食塩水		1 本	50mL	15分で点滴		
④	ベバシズマブ()mg	400mg	1 本	★生食100mL	1時間30分で点滴 (2回目以降の投与時間は60分まで短縮可) (3回目以降の投与時間は30分まで短縮可)		
		100mg	1 本				
⑤	生理食塩水		1 本	50mL	全開で点滴		
⑥	デキサメタゾン 6.6mg		1.5 本	★生食50mL	⑤終了後～		
	ネオレスタール10mg		1 本				
	ファモチジン20mg		1 本				
⑦	アロキシバック		1 本		⑥終了後～ 30分で点滴		
⑧	パクリタキセル「NK」()mg	100mg	1 本	5%ブドウ糖500mL	⑦アロキシ終了後～ 3時間で点滴		
		30mg	1 本				
⑨	カルボプラチン「NK」()mg	450mg	1 本	5%ブドウ糖250mL	⑧パクリタキセル終了後～ 1時間00分で点滴		
		150mg	1 本				
		50mg	1 本				
⑩	生食50mL		1 本		⑨カルボプラチン終了後～ 全開で点滴		

