

NO	1080	レジメン名	VP-16/CDDP(裏面指示あり)		
病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS
	年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)
	歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)
【適応がん種】 SCLC		VP-16/CDDP		CCr補正	GOT補正
1・エトポシド 100 mg/m ² DAY1. 2. 3				カルパ-ト使用	-
2・シスプラチン 80 mg/m ² DAY1				60~	60~禁180 1.5~禁3.1
放射線療法と併用の場合は4週間毎				WBC基準	HGB基準 PLT基準
21~28日(3~4週)1クール				-	-
				【病状】	
				1 全て説明している	
				2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない	
				3 未告知である	
				【治療】	
				1 抗癌剤による治療・予防と説明	
				2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明	
				3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明	
				4 薬に関しては説明していない	
				平成20年8月1日 改訂	
NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
①	パロノセトロンバック		1 本		全開で点滴
②	デキサメタゾン 6.6mg		2 本	生食50mL	15分で点滴
③	エトポシド()mg	100mg	本	生食500mL	②終了後~ 2時間で点滴
④	生食50mL		1 本		③終了後~ 全開で点滴
⑤	アプレピタント125mg内服				
⑥	アスパラギン酸カリウム		2 本	デノサリン500mL	1時間で点滴
	硫酸マグネシウム		1 本		
⑦	マンニトール 300mL		1 本		⑥終了後~ 30分で点滴
⑧	シスプラチン()mg	50mg	本	【生食250mL】	⑦終了後~ 2時間で点滴
		25mg	本		
		10mg	本		
⑨	ヴィーンF500mL		1 本		⑧終了後~ 1時間で点滴
⑩	ヴィーンF500mL		1 本		⑨終了後~ 1時間で点滴
⑪	アプレピタント80mg内服				
⑫	デキサメタゾン 6.6mg		1 本	生食50mL	15分で点滴
⑬	エトポシド()mg	100mg	本	生食500mL	⑫終了後~ 2時間で点滴
⑭	生食50mL		1 本		⑬終了後~ 全開で点滴
⑮	デカドロン錠 0.5mg		16 錠	毎食後 (朝6-昼6-夕4)	Day4内服分
【看護師注意事項】					
○点滴セットはJMS社製JY-PFC341F7を使用					

										202201作成		
月日	指示			指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
			①~⑩	DAY1								
			⑪⑫⑬⑭	DAY2								
			⑪⑫⑬⑭⑮	DAY3								

医師指示表					
月日	指示事項			指示者名	受領者名
	シスプラチン投与日 1日2回 尿量測定			↓	
	①レジメンの点滴開始からの5時間 ②その後の5時間				
	↓				
	CDDP当日.....上記5時間の尿量が500mL以下の場合ラシックス40mg1錠内服				
★院内セットメニュー 【Chemo CDDP】					
	CDDP翌日から内服(レジメンに組み込み済み)				↓
	デカドロン(0.5mg)	16錠	毎食後(朝6-昼6-夕4)	Day4のみ内服	
	アプレピタント(80mg)	1Cap	朝食後	Day2-3まで内服	
	吐気時(必要に応じて処方)				
	メトクロプラミド錠	1回2錠	10回分(1日3回まで)		