

NO 2014		レジメン名		アドセトリス(ブレンツキシマブ ヘドチン)				
病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名	
			年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)	
			歳	cm	kg	m <sup>2</sup>	ml/min (mg/dl)	
【適応がん種】HL				CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成29年6月15日 新規	
1・アドセトリス 1.8 mg/kg				60~禁25	-	-		
21日(3週)1クール				WBC基準	HGB基準	PLT基準		
				-	-	-		
NO 薬品1		規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与法		
① ネオレスタール			1 本			全開で点滴		
① アドセトリス( )mg		50mg	本					
① 注射用水20mL (1Vあたり10.5mLで溶解し必要量を生食へ5mg/mLを溶液作成)			本	生食100mL		30以上かけて点滴		
② 生食50mL			本			全開で点滴		
【禁忌】 肝機能障害								
ブレオマイシンを投与中の患者								
【相互作用】 ブレオマイシン併用禁忌 肺毒性(間質性肺炎等)が発現するおそれがある。								
CYP3A4阻害剤, ケトコナゾール, 等併用注意 AUCが上昇								
【医師注意事項】								
月日		指示			指示医			20170615新規
		① DAY1			受け	監査	払い	払監
					調製	調監	前確	実施