

NO 2033		レジメン名		Hyper-CVAD							
病棟 患者番号 氏名		癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名					
		年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)					
		歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)					
【適応がん種】悪性リンパ腫/ALL CPA/VCR/ADR/DEXA				CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成21年12月17日 改訂				
1・シクロfosファミド 300 mg/m ² DAY1,2,3,- × 2/day				60～禁30	180～	3.1～禁5.1					
2・ピンクリスチン 2mg/body DAY-, -, 4・・・11				60～	180～	3.1～禁5.1					
3・ドキシソルピシン 50 mg/m ² DAY-, -, 4											
4・ウロミテキサン 600 mg/m ² DAY1,2,3,- 5・デキサメタゾン 33 mg/body DAY1,2,3,4・・・11～14 21日(3週間)1クール				WBC基準 3000	HGB基準 -	PLT基準 60000					
NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法							
① アロキシバック		1 本		9:15～9:30 15分で点滴							
② デキサメタゾン 6.6mg		5 本	生食100mL	9:30～10:00 30分で点滴							
③ ウロミテキサン()mg	100mg	本	ソルデム3A 500mL	②終了後または③前日分 終了後～ 別ルートより24時間で点滴							
持続(day1～3)	400mg	本									
④ エンドキサン()mg	500mg 100mg	本 本	生食500mL	10:00～12:00 2時間で点滴							
⑤ ハルトマンPH8 500mL		1 本		12:00～22:00 10時間で点滴							
⑥ エンドキサン()mg	500mg 100mg	本 本	生食500mL	22:00～24:00 2時間で点滴							
⑦ ハルトマンPH8 500mL		1 本		0:00～10:00 10時間で点滴							
⑧ デキサメタゾン 6.6mg		5 本	生食100mL	30分で点滴							
⑨ オンコピン()mg	1mg	本	★生食50mL	⑧終了後～ 全開で投与							
⑩ ドキシソルピシン()mg	50mg 10mg	本 本	★5%ブドウ糖500mL	⑨終了後～ 24時間で点滴							
⑪ 生食50mL		1 本		⑩または⑨終了後～ 全開で点滴							
21日1クール											
月日	指示		指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①②③④⑤⑥⑦		DAY1								
	②③④⑤⑥⑦		DAY2								
	②③④⑤⑥⑦		DAY3								
	⑧⑨⑩⑪		DAY4								
	⑧⑨ ⑪		DAY11								
	⑧		DAY12								
	⑧		DAY13								
	⑧		DAY14								