

NO 2043		レジメン名		MCEC			
病棟 患者番号 氏名		癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名	
		年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)	
		歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)	
【適応がん種】非ホジキンリンパ腫				CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂
1・サイメリン	200 mg/m ²	DAY1、-、-、-、-、6	-	-	-		
2・カルボプラチン	300 mg/m ²	DAY-、2、3、4、5	45~	180~	3.1~禁5.1		
3・エトポシド	125×4 mg/m ²	DAY-、-、3、4、5	60~	60~禁180	1.5~禁3.1		
4・メスナ	20×3 mg/kg	DAY-、-、-、-、-、6、7	-	-	-		
5・シクロフォスファミド	50 mg/kg	DAY-、-、-、-、-、6、7	45~	180~	3.1~禁5.1		
61~65歳の症例では80%に減量を考慮する。				WBC基準	HGB基準	PLT基準	
NO 薬品1		規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与方法	
day1							
①	デキサート	6.6mg	1 本	★生食50mL		15分で点滴	
②	サイメリン()mg	50 mg	本	▲生食250mL		デキサート終了後 1時間かけて	
③	生食50mL		1 本			サイメリン終了後~ 全開で点滴	
day2							
①	イメンド125mg内服						
②	デキサート	6.6mg	1 本	★生食50mL		15分で点滴	
	グラニセトロン「NK」1mg	1mg	1 本				
③	カルボプラチン「NK」()mg	450mg	本	5%ブドウ糖250mL		デキサート終了後~ 1時間で点滴	
		150mg	本				
		50mg	本				
④	生食50mL		1 本			カルボプラチン終了後~ 全開で点滴	
day3・day4・day5							
①	イメンド80mg内服						
②	デキサート	6.6mg	1 本	★生食50mL		15分で点滴	
	グラニセトロン「NK」1mg	1mg	1 本				
③	カルボプラチン「NK」()mg	450mg	本	5%ブドウ糖250mL		デキサート終了後~ 1時間で点滴	
		150mg	本				
		50mg	本				
ペプシド1日量()mg				1本あたり200mgを目処に4本へ分割 投与直前に溶解			
④	ペプシド()mg	100mg	本	5%ブドウ糖500mL		カルボラチン終了後~ 2時間で点滴	
⑤	ペプシド()mg	100mg	本	5%ブドウ糖500mL		④終了後~ 2時間で点滴	
⑥	ペプシド()mg	100mg	本	5%ブドウ糖500mL		⑤終了後~ 2時間で点滴	
⑦	ペプシド()mg	100mg	本	5%ブドウ糖500mL		⑥終了後~ 2時間で点滴	
⑧	生食50mL		1 本			ペプシド終了後~ 全開で点滴	

day6					
①	ハルトマンPH8 500mL			病棟在庫(主ルート) 別オーダー	
②	イメンド80mg内服				
③	デキサート グラニセトロン「NK」1mg	6.6mg 1mg	1 本 1 本	★生食50mL	9:15~9:30 15分で点滴
④	サイメリン()mg	50 mg	本	▲生食250mL	9:30~10:30 側・1時間かけて
⑤	ウロミテキサン()mg	400mg 100mg	本 本	5%ブドウ糖100mL	10:30~11:00 側・30分で点滴
⑥	エンドキサン()mg	500mg 100mg	本 本	ソルデム3A500mL	11:00~14:00 側・3時間で点滴
⑦	ウロミテキサン()mg	400mg 100mg	本 本	5%ブドウ糖100mL	18:00~18:30 側・30分で点滴
⑧	ウロミテキサン()mg	400mg 100mg	本 本	5%ブドウ糖100mL	22:00~22:30 側・30分で点滴

day7					
①	ハルトマンPH8 500mL			病棟在庫(主ルート) 別オーダー	
②	デキサート グラニセトロン「NK」1mg	6.6mg 1mg	1 本 1 本	★生食50mL	10:15~10:30 側・15分かけて
③	ウロミテキサン()mg	400mg 100mg	本 本	5%ブドウ糖100mL	10:30~11:00 側・30分で点滴
④	エンドキサン()mg	500mg 100mg	本 本	ソルデム3A500mL	11:00~14:00 側・3時間で点滴
⑤	ウロミテキサン()mg	400mg 100mg	本 本	5%ブドウ糖100mL	18:00~18:30 側・30分で点滴
⑥	ウロミテキサン()mg	400mg 100mg	本 本	5%ブドウ糖100mL	22:00~22:30 側・30分で点滴

day9に自家末梢血幹細胞移植