

NO **2053** レジメン名 **D-Bd療法【9コース以降用】**


病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
				~	
	年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)
	歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)

【適応がん種】多発性骨髄腫	ダラツムマブ ホルテゾミブ デキサメタゾン	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂
1・ダラキューロ 1800 mg/m ² DAY1		-	-	-	
28日(4週)1クール		WBC基準	HGB基準	PLT基準	

NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
①	レナデックス(4)	5錠	内服	(前投与 オーダー不要)	
②	カロナール(200)4錠、レスタミン(10)5錠		内服	(前投与 オーダー不要)	
③	ダラキューロ (1800)mg	1800mg	1本	15mLを3~5分かけて皮下注	

【ダラキューロ投与時の注意】

- 臍から左右7.5cmの腹部皮下に投与(右図参照)
- バイアルは投与30分以上前に冷蔵庫から取り出す
- 調整後、室温および室内光下で保存する場合は4時間を上限とする
- 注射針は23~25G又は翼状針で投与する



□ダラキューロ投与中は間接クームス試験が偽陽性になる可能性がある
(ダラキューロが赤血球上のCD38と結合するため)

□ダラキューロ投与前に不規則抗体のスクリーニングを含めた一般的な輸血前検査が望ましい

□ダラキューロによる間接クームス試験の干渉を回避するためには、ジチオスレートール(DTT)処理を考慮すること

月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①②③	DAY1								

202108作成