

NO **2055** レジメン名 **DMPB療法【2-9コース目用】**

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
				~	
	年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)
	歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)


【適応がん種】 多発性骨髄腫 ダラツムマブ メルファラン プレドニゾロン ホルテゾミブ 1・ダラキューロ 1800 mg/body DAY1.22 2・ベルケイド 1.3 mg/m2 DAY1.8.22.29 3・アルケラン 9 mg/m2 DAY1.2.3.4. 4・プレドニゾロン 60 mg/m2 DAY2.3.4	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂
	-	-	-	
	WBC基準	HGB基準	PLT基準	

42日(6週)1クール 基本はDAY1=月曜日開始。月/木 投与

NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
①	カロナール(200)4錠,レナデックス(4)5錠,レスタミン(10)5錠			内服 (前投与 オーダー不要)	
②	ダラキューロ (1800)mg	1800mg	1本	15mLを3~5分かけて皮下注	
③	ベルケイド ()mg	3mg	本	生食20mL 0.06本 【生食 1.2mL】	

【ダラキューロ投与時の注意】

- 臍から左右7.5cmの腹部皮下に投与(右図参照)
- バイアルは投与30分以上前に冷蔵庫から取り出す
- 調整後、室温および室内光下で保存する場合は4時間を上限とする
- 注射針は23~25G又は翼状針で投与する



□ダラキューロ投与中は**間接クームス試験が偽陽性になる可能性がある**
(ダラキューロが赤血球上のCD38と結合するため)

□ダラキューロ投与前に不規則抗体のスクリーニングを含めた一般的な輸血前検査が望ましい

□ダラキューロによる間接クームス試験の干渉を回避するためには、**ジチオスレート(DTT)処理を考慮すること**

月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①②③ DAY1									
	③ DAY8									
	①②③ DAY22									
	③ DAY29									

202108作成