

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------|------------|--------------------------------|----------------------------|-------|---------|
| NO 4010 | | レジメン名 | | DTX(Weekly) | | | |
| 病棟 | 患者番号 | 氏名 | 癌種 | ステージ | PS | クール数 | 指示医師名 |
| | | | | | | ~ | |
| | 年齢 | 身長 | 体重 | 体表面積 | GFR(血清クレアチニン値) | | |
| | 歳 | cm | kg | m ² | ml/min (mg/dl) | | |
| 【適応がん種】MMK・MK・EK | | | | DTX | CCr補正 | GOT補正 | T-Bil補正 |
| 1・ドセタキセル 25~30 mg/m ² DAY1. 8. 15 | | | | | - | - | - |
| ★アルコール含有説明要 | | | | | | | |
| 28日(4週)1クール | | | | WBC基準 | HGB基準 | PLT基準 | |
| | | | | - | - | - | |
| | | | | 【病状】 | | | |
| | | | | 1 全て説明している | | | |
| | | | | 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない | | | |
| | | | | 3 未告知である | | | |
| | | | | 【治療】 | | | |
| | | | | 1 抗癌剤による治療・予防と説明 | | | |
| | | | | 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 | | | |
| | | | | 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 | | | |
| | | | | 4 薬に関しては説明していない | | | |
| | | | | 平成20年7月1日 改訂 | | | |
| NO | 薬品1 | 規格 | 本数 | 薬品2(規格本数) | 時間・投与法 | | |
| ① | デキサメタゾン 6.6mg グラニセトロン1mg | | 1 本 1 本 | 生食50mL | 15分で点滴 | | |
| ② | ドセタキセル()mg | 20mg | 1 本 | ▲5%ブドウ糖250mL | ①デキサメタゾン終了後 ~ 1時間で点滴 | | |
| ③ | 生食50mL | | 1 本 | | ②ドセタキセル終了後~ 全開で点滴 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|-------|----|----|----|----|----|----|----------|----|
| | | | | | | | | | | | 202201更新 | |
| 月日 | 指示 | | | 指示医 | 受け | 監査 | 払い | 払監 | 調製 | 調監 | 前確 | 実施 |
| | ①~③ | | | DAY1 | | | | | | | | |
| | ①~③ | | | DAY8 | | | | | | | | |
| | ①~③ | | | DAY15 | | | | | | | | |