

<b>NO 4060</b>		<b>医師指示書</b>		<b>CDGP単剤</b>									
病棟 患者番号 氏名		癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名							
		年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)							
		<b>歳</b>	<b>cm</b>	<b>kg</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	ml/min (mg/dl)							
<b>【適応がん種】</b> Eso K 1・アクプラ <b>90 mg/m<sup>2</sup></b> DAY1 添付文書 80-100m <sup>2</sup>				CDGP	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	<b>【病状】</b> 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である <b>【治療】</b> 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂					
				下記参照	下記参照	下記参照							
				30~	-	禁5.1							
				WBC基準		PLT基準							
				3000		7500							
28日(4週)1クール					T-Bil基準	Scr基準							
					2	基準値							
NO 薬品1		規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与法							
①	デキサート6.6mg		1 本	生食50mL		30分点滴							
	グラニセロン1mg		1 本										
②	アクプラ( )mg	100mg	( ) 本	生食250mL		①デキサート+グラニセロン終了後1時間で点滴							
		10mg	( ) 本										
③	ヴィーンF500mL		1 本			④アクプラ終了後~1時間で点滴							
④	ヴィーンF500mL		1 本			⑤ヴィーンF終了後~1時間で点滴							
月日		指示		指示医		受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
		①~④		DAY1									
<b>【1. 腎機能障害時の対応】</b> <input type="checkbox"/> Ccr40-60 80mg/m <sup>2</sup> へ減量 <input type="checkbox"/> 重篤な腎障害 禁忌													