

NO 4070-1 レジメン名		BV (Biweekly)			
病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
		年齢	身長	体重	体表面積
		歳	cm	kg	m²
					ml/min (mg/dl)
【適応がん種】大腸癌		BV	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正
1 ベバシズマブ 5 mg/kg DAY1			-	-	-
14日(1週)1クール		WBC基準	HGB基準	PLT基準	
		-	-	-	
		【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成22年2月22日 改訂			
NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法	
① 生食50mL		1 本		全開で投与	
② ベバシズマブ()mg	400mg	本	生食100mL	1時間30分で点滴	
	100mg	本			
③ 生食50mL		1 本		ベバシズマブ終了後～全開で投与	
【1. 原則禁忌】 ●脳転移患者(脳出血のおそれ), 喀血(2.5mL以上の鮮血)既往患者 【2. 投与前必須検査】 ●投与前・後に血圧測定 BP180/120を超える場合は主治医へ報告 ●アバチン検査セット (●血液算定●T-Bil●GOT●GPT●ALP●ALB●Scr●CRP●尿蛋白測定●PT-INR●APTT●フィブリノーゲン●D-ダイマー)					
202201改訂					
月日	指示	指示医 受け 監査 払い 払監 調製 調監 前確 実施			
	①②③	DAY1			
ベバシズマブ投与 リスク患者: 1)消化管など腹腔内の炎症を合併(消化管穿孔のおそれ) 2)大きな手術の術創が治癒していない(創傷治癒遅延による合併症) 3)先天性出血素因、凝固系異常のある患者(出血のおそれ) 4)抗凝固剤投与中の患者(出血のおそれ) 5)血栓塞栓既往患者(心筋梗塞、脳梗塞、深部静脈血栓症、肺塞栓症のおそれ) 6)高血圧患者(悪化のおそれ) 7)高齢者(重大な副作用が現れやすい) 8)妊婦、授乳婦(動物実験で催奇形性、授乳中に移行)					