

NO 4072		レジメン名		MMC/5FU 【RT併用】			
病棟 患者番号 氏名		癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名	
		年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)	
		歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)	
【適応がん種】 肛門がん(扁平上皮)		MMC/5FU		CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂
1・MMC	10 mg/m ²	DAY1・29		30~	-	禁5.1	
2・5-FU	800 mg/m ²	DAY1~4・29~32 (NCCNでは1000mg)		60~禁30	180~	3.1~禁5.1	
42日(6週)1クール		RT併用		Ne基準	HGB基準	PLT基準	
NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法			
① グラニセトロン「NK」1mg		1 本	★生食50mL	15分で点滴			
② マイトマイシンC()mg	2mg	本	蒸留水100mL×0.5 【蒸留水50mL】	①グラニセトロン終了後～ 全開で点滴			
③ フロオウラシル持続()mg	1000mg	本	5%ブドウ糖500mL	②終了後～ 24時間で点滴			
④ 生食50mL		1 本		③フロオウラシル終了後～ 全開で点滴			

★1.7万円/42日1クール				★96時間15分×2				200807更新				
月日	指示			指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①②③	DAY1										
	③	DAY2										
	③	DAY3										
	③④	DAY4										
	休み	DAY5~28										
	①②③	DAY29										
	③	DAY30										
	③	DAY31										
	③④	DAY32										
	休み	DAY33~42										