

NO 4098-1 レジメン名		BV-mFOLFOXIRI(5-FUポンプ)					
病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
						~	
年齢		身長		体重		体表面積	
歳		cm		kg		m ²	
							GFR(血清クレアチニン値) ml/min (mg/dl)
【適応がん種 大腸がん BV I-LV/I-OHP/CPT-11/5FU			Ccr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】	
1・ベバシズマブ 5 mg/kg DAY1			-	-	-	1 全て説明している	
2・イリノテカン 150 mg/m ² DAY1			Ccr60-40-20(50-35-25%)			2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない	
3・オキサリプラチン 85 mg/m ² DAY1			60~			3 未告知である	
4・レボホリナート 200 mg/m ² DAY1			30~			【治療】	
5・フルオウラシル 持続 2400 mg/m ² DAY1			Ne基準			1 抗癌剤による治療・予防と説明	
14日(2週)1クール			HGB基準			2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明	
			PLT基準			3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明	
			下記参照			4 薬に関しては説明していない	
NC 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与法		
① アプレピタント内服(DAY1;125mg) DAY2-3(80mg)は処方必要					薬局払出		
② パロノセトロンバック		1 本			全開で点滴		
③ デキサメタゾン6.6mg ブスコパン		1.5 本	★生食50mL		パロノセトロン終了後		
		1.0 本			15分で点滴		
④ ベバシズマブ()mg	400mg	本	生食100mL		デキサメタゾン終了後~		
	100mg	本			主・1時間30分で点滴		
⑤ 生食50mL		1 本			ベバシズマブ終了後~		
⑥ イリノテカン()mg	100mg	本	生食500mL		生食終了後~		
	40mg	本			主・1時間30分で点滴		
⑦ オキサリプラチン()mg	100mg	本	▲5%ブドウ糖250mL		イリノテカン終了後~		
	50mg	本			主・2時間で点滴		
⑧ レボホリナート()mg	100mg	本	▲5%ブドウ糖250mL		イリノテカン終了後~		
	25mg	本			側・2時間で点滴		
⑨ フルオウラシル 持続()mg	1000mg	本	生食で全量120mLに調整(2.5mL×46h)		フルオウラシル Bolus終了後~		
	250mg	本			主・46時間で持続点滴 シュアチューサーポンプ使用!!		
【適正投与】							
No4096 FOLFIRINOX、アパスタチンを含むレジメンを参照 投与量類似							
【慎重投与】							
No4096 FOLFIRINOX、アパスタチンを含むレジメンを参照 投与量類似							
【禁忌】							
No4096 FOLFIRINOX、アパスタチンを含むレジメンを参照 投与量類似							
202201 改訂							
月日	指示			指示医 受け 監査 払い 払監 調製 調監 前確 実施			
			①②③④⑤⑥⑦⑧⑨	DAY1			

★院内セットメニュー 【高度催吐性リスクレジメン】						
	DAY 2~4(翌日から内服)					
	デカドロン(0.5mg)	16錠	分2~分3	3日分		
	アプレピタント(80mg)	1Cap	朝食後	2日分		
	吐気時(必要に応じて処方)					
	メトクロプラミド錠	1回2錠	10回分(1日3回まで)			