

NO **4103** レジメン名 **GCS療法**

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
				~	
年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)	
歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)	

【適応がん種】胆道がん	GEM/CDDP/S1	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂
1・ ゲムシタビン 1000 mg/m ² DAY1		-	-	-	
2・ シスプラチン 25 mg/m ² DAY1		60~禁30	180~ND	3.1~禁5.1	
3・ エスワンタイホウ 下記参照 DAY1~7					
14日(2週)1クール		Ne基準 1000	HGB基準 -	PLT基準 70000	
		GOT基準 -	T-Bil基準 -	Scr基準 -	

NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与方法
① アロキシバック		1 本		全開で点滴
② デキサメタゾン 6.6mg		1.5 本	デノサリン500mL	1時間で点滴
③ シスプラチン()mg	50mg	本	ラシックス 1本! 生食500mL	デキサメタゾン終了後~ 1時間で点滴
	25mg	本		
	10mg	本		
④ ゲムシタビン()mg	1000mg	本	5%ブドウ糖100mL	シスプラチン終了後~ 30分で点滴
	200mg	本		
⑤ 生食1L		1 本		ゲムシタビン終了後~ 1時間30分で点滴

★DAY1に エスワン配合錠7日分 オーダー必要★

エスワン配合錠 80mg/m ² (最大120mg/BODY) 分2 7日分	
A	エスワン配合錠 80mg/BODY (20mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 7日分
⑥ B	エスワン配合錠100mg/BODY (25mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 7日分
C	エスワン配合錠120mg/BODY (20mg)6Cap 朝夕食後(3-0-3) 7日分
1週間服用 1週間休み	

【減量基準】
白血球 1000未満 または 血小板25000未満とするが、感染症リスクなどを考慮しそれ以上でも減量を検討すること。
※原則として、シスプラチンは低用量であるため、まずはGEMのみを減量する。
※必要に応じてエスワンタイホウも1段階ずつ減量を考慮する。

【減量方法】
1段階 GEM 800mg/m²→2段階 GEM 600mg/m²

202201改訂										
月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①②③④⑤⑥	DAY1								