

NO **4135** レジメン名 **CDDP/S1 (3-1or2)(裏面指示あり)**

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
	年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)
	歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)

【適応がん種】MK・NSCLC 1・シスプラチン 60 mg/m ² DAY8 2・エスワン配合錠 80 mg/m ² 3週服用 1~2週休み(胃がん) (最大120mg/BODY) 3週服用 2週休み(肺がん) 28日~35日(4週~5週)1クール	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂
	60~禁30	180~ND	3.1~禁5.1	
	80~禁30	60~禁150	2.4~禁3	
	WBC基準	HGB基準	PLT基準	
	2000	8	75000	
	GOT基準	T-Bil基準	Scr基準	
	150	3	1.5	

NO 薬品1 規格 本数 薬品2(規格本数) 時間・投与法

★DAY1に エスワン配合錠21日分 オーダー必要★

エスワン配合錠 80mg/m ² (最大120mg/BODY) 分2 21日分	
A	エスワン配合錠 80mg/BODY (20mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 21日分
① B	エスワン配合錠100mg/BODY (25mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 21日分
C	エスワン配合錠120mg/BODY (20mg)6Cap 朝夕食後(3-0-3) 21日分
3週間服用 1~2週間休み	

②	アプレピタント125mg内服			
③	パロノセトロンバック	1	本	②内服後~全開
④	デキサメタゾン 6.6mg アスパラギン酸カリウム 硫酸マグネシウム	1.5 2 1	本 本 本	デノサリン500mL 1時間で点滴
⑤	マンニトール 300mL	1	本	デキサート終了後~ 30分で点滴
⑥	シスプラチン()mg	50mg 25mg 10mg	本 本 本	【生食250mL】 マンニトール終了後~ 1時間で点滴
⑦	ヴィーンF500mL	1	本	シスプラチン終了後~ 1時間で点滴
⑧	ヴィーンF500mL	1	本	ヴィーンF終了後~ 1時間で点滴
⑨	デノサリン500mL	1	本	ヴィーンF終了後~ 1時間で点滴

202201改訂

月日	うら面オーダー必要	指示医 受け	うら面確認必要	製 調監 前確 実施
	①	DAY1		
	②~⑨	DAY8		

医師指示表

月日	指示事項	指示者名	受領者名
	シスプラチン投与日 1日2回 尿量測定	↓	
	①レジメンの点滴開始からの5時間 ②その後の5時間		
	↓		
	CDDP当日……………上記5時間の尿量が500mL以下の場合ラシックス40mg1錠内服		

★院内セットメニュー 【高度催吐性リスクレジメン】

	DAY 2~4(翌日から内服)				
	デカドロン(0.5mg)	16錠	毎食後(朝6-昼6-夕4)	3日分	
	アプレピタント(80mg)	1Cap	朝食後	2日分	
	吐気時(必要に応じて処方)				
	メクロプラミド錠	1回2錠	10回分(1日3回まで)		

備考

【延期基準】

- 白血球2000未満…好中球1000未満…血小板7.5万未満…HGB8g未満
- GOT、GPT150以上…T-Bil 3mg/dl以上
- クレアチニン1.5mg/dl以上