

NO	5008	レジメン名	Weekly TC-BV							
病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名					
	年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)					
	歳	cm	kg	m ²	ml/min					
【適応がん種】 卵巣K 子宮頸K			PTX/CBDCA/BV		【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年8月1日 改訂					
1・パクリタキセル 80 mg/m ² DAY1. 8. 15			CCr補正	GOT補正		T-Bil補正				
2・カルボプラチン AUC1.5-2 DAY1. 8. 15 【カルバートの式: CBDCA量(mg) = (GFR+25) × AUC】			-	-		-				
3・アバステン 15 mg/kg DAY1			カルバート使用	-		-				
★アルコール含有説明要 28日(4週)1クール			WBC基準	HGB基準	PLT基準					
			-	-	-					
NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与法					
①レスタミンコーワ5錠 内服 (前投与 オーダー不要)					②デキサメタゾン同時に内服					
②	デキサメタゾン 6.6mg ファモチジン20mg	1.5 本 1 本	★生食50mL		①と同時に 15分で点滴					
③	グラニセトロン 1mg	1 本	生食100mL		②終了後～ 30分で					
④	パクリタキセル()mg	100mg	本	▲5%ブドウ糖250mL	③終了後～ 1時間で点滴					
		30mg	本							
⑤	カルボプラチン()mg	150mg	本	▲5%ブドウ糖250mL	④終了後～ 1時間で点滴					
		50mg	本							
⑥	生食50mL	1 本			⑤終了後～全開で投与					
⑦	アバステン()mg	400mg	本	生食100mL	⑥終了後～ 1時間30分で点滴					
		100mg	本							
⑧	生食50mL	1 本			⑦終了後～ 全開で					
【1. 原則禁忌】 ●脳転移患者(脳出血のおそれ) 【2. 投与前必須検査】 ●投与前・後に血圧測定 BP180/120を超える場合は主治医へ報告 ●アバステン検査セット(●血液算定●T-Bil●GOT●GPT●ALP●ALB●Scr●CRP●尿蛋白測定●PT-INR●APTT●フィブリノーゲン●D-ダイマー)										
【看護師注意事項】 ○点滴セットはJMS社製JY-PFC341F7を使用										
202201改訂										
月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①～⑥⑦⑧	DAY1								
	①～⑥	DAY8								
	①～⑥	DAY15								
	休み	DAY22								
アバステン投与 リスク患者: 1)消化管など腹腔内の炎症を合併(消化管穿孔のおそれ) 2)大きな手術の術創が治癒していない(創傷治癒遅延による合併症) 3)先天性出血素因、凝固系異常のある患者(出血のおそれ) 4)抗凝固剤投与中の患者(出血のおそれ) 5)血栓塞栓既往患者(心筋梗塞、脳梗塞、深部静脈血栓症、肺塞栓症のおそれ) 6)高血圧患者(悪化のおそれ) 7)高齢者(重大な副作用が現れやすい) 8)妊婦、授乳婦(動物実験で催奇形性、授乳中に移行)										