

NO	5021	レジメン名	TC(triweekly)									
病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名					
			年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)					
			歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)					
【適応がん種】 卵巣K			PAC/CBDCA	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年8月1日 改訂					
1・パクリタキセル 170 mg/m ² DAY1				-	-	-						
2・カルボプラチン AUC 6 DAY1			カルバート使用	-	-							
【カルバートの式: CBDCA量(mg) = (GFR+25) × AUC】												
★アルコール含有説明要			WBC基準	HGB基準	PLT基準							
21(3週)1クール												
NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法							
①	レスタミンコーワ5錠	内服	(前投与 オーダー不要)									
②	アプレピタント125mg		1 錠									
③	デキサメタゾン 6.6mg		3 本	★生食50mL								
	ファモチジン20mg		1 本		15分で点滴							
④	パロノセトロンバック		1 本		③終了後～ 30分で点滴							
⑤	パクリタキセル()mg	100mg 30mg	本 本	5%ブドウ糖500mL	④終了後～ 3時間で点滴							
⑥	カルボプラチン()mg	450mg 150mg 50mg	本 本 本	5%ブドウ糖500mL	⑤終了後～ 2時間で点滴							
⑦	生食50mL		1 本		⑥終了後～							
【看護師注意事項】												
○点滴セットはJMS社製JY-PFC341F7を使用												
202112更新												
月日	指示			指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
			①～⑦	DAY1								
			休み	DAY8								
			休み	DAY15								
★院内セットメニュー 【高度催吐性リスクレジメン】												
DAY 2～4(翌日から内服)												
	デカドロン(0.5mg)	16錠	毎食後(朝6-昼6-夕4)			3日分						
	アプレピタント(80mg)	1Cap	朝食後			2日分						
吐気時(必要に応じて処方)												
	プリンペラン錠	1回2錠	10回分(1日3回まで)									