

NO 5027		レジメン名		CPT-11/CDDP					
病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名		
			年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)		
			歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)		
【適応がん種】 卵巣K				CPT-11/CDDP		CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月11日 改訂
1・イリノテカン		60 mg/m ²	DAY1. 8. 15		60~	-	-		
2・シスプラチン		60 mg/m ²	DAY1		60~禁30	180~	3.1~禁5.1		
28日(4週)1クール				WBC基準	HGB基準	PLT基準			
				3000	-	100000			
NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法				
①	アプレピタント 125mg				内服				
②	パロノセトロンバック		1 本		①内服後~全開				
③	デキサメタゾン 6.6mg		1.5 本	デノサリン500mL	1時間で点滴				
	アスパラギン酸カリウム 硫酸マグネシウム		2 本 1 本						
④	イリノテカン()mg	100mg 40mg	本 本	5%ブドウ糖500mL	デキサメタゾン終了後~ 1時間30分で点滴				
⑤	マンニトール 300mL		1 本		イリノテカン終了後~ 30分で点滴				
⑥	シスプラチン()mg	50mg	本	【生食250mL】	マンニトール終了後~ 1時間で点滴				
		25mg	本						
		10mg	本						
⑦	ヴィーンF500mL		1 本		シスプラチン終了後~ 1時間で点滴				
⑧	ヴィーンF500mL		1 本		ヴィーンF終了後~ 1時間で点滴				
⑨	デノサリン500mL		1 本		ヴィーンF終了後~ 1時間で点滴				
⑩	パロノセトロンバック		1 本		全開で点滴				
⑪	デキサメタゾン 6.6mg		1 本	生食50mL	15分で点滴				
⑫	イリノテカン()mg	100mg	本	生食500mL	パロノセトロン終了後~ 1時間30分で点滴				
		40mg	本						
⑬	生食50mL		1 本		イリノテカン終了後~ 15分で点滴				
							202201改訂		
月日		うら面オーダー必要		指示医 受け		うら面確認必要			
		①~⑨		DAY1					
		⑩~⑬		DAY8					
		⑩~⑬		DAY15					

医師指示表				
月日	指示事項		指示者名	受領者名
	シスプラチン投与日 1日2回 尿量測定		↓	
	①レジメンの点滴開始からの5時間 ②その後の5時間			
	↓			
	CDDP当日……………上記5時間の尿量が500mL以下の場合ラシックス40mg1錠内服			

★院内セットメニュー 【高度催吐性リスクレジメン】				
	DAY 2~4(翌日から内服)			
	デカドロン(0.5mg)	16錠	毎食後(朝6-昼6-夕4)	3日分
	アプレピタント(80mg)	1Cap	朝食後	2日分
	吐気時(必要に応じて処方)			
	プリンペラン錠	1回2錠	10回分(1日3回まで)	