

NO **5043** レジメン名 **DC (triweekly)-BV**

病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
			年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)
			歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)

【適応がん種】卵巣K	DOC/CBDCA/BV	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年8月1日 改訂
1・ドセタキセル 70 mg/m² DAY1		-	-	-	
2・カルボプラチン AUC 6 DAY1 【カルバートの式: CBDCA量(mg) = (GFR + 25) × AUC】					
3・アバステン 15 mg/kg DAY1		カルバート使用	-	-	
21(3週)1クール		WBC基準	HGB基準	PLT基準	

NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
①	アプレピタント125mg		1 錠		
②	パロノセトロンバッグ		1 本		全開で点滴
③	デキサメタゾン 6.6mg		1.5 本	生食50mL	②終了後～
④	ドセタキセル()mg	80mg	本	▲5%ブドウ糖250mL	③終了後～ 1時間で点滴
		20mg	本		
⑤	カルボプラチン()mg	450mg	本	5%ブドウ糖500mL	④ドセタキセル終了後～ 2時間で点滴
		150mg	本		
		50mg	本		
⑥	生食50mL		1 本		⑤終了後～全開で
⑦	アバステン()mg	400mg	本	生食100mL	⑥終了後～ 1時間30分で点滴
		100mg	本		
⑧	生食50mL		1 本		⑦終了後～ 全開で

年月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施	202202作成
	①～⑧										
			DAY1								

★院内セットメニュー 【高度催吐性リスクレジメン】				
DAY 2～4(翌日から内服)				
デカドロン(0.5mg)	16錠	毎食後(朝6-昼6-夕4)		3日分
アプレピタント(80mg)	1Cap	朝食後		2日分
吐気時(必要に応じて処方)				
プリンペラン錠	1回2錠	10回分(1日3回まで)		