

<b>NO 7001</b>		<b>レジメン名</b>		<b>DTX (Triweekly) /S1(2-1)</b>																																											
病棟 患者番号 氏名		癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名																																									
		年齢	身長	体重	体表面積	GFR (血清クレアチニン値)																																									
		<b>歳</b>	<b>cm</b>	<b>kg</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	ml/min (mg/dl)																																									
【適応がん種】頭頸部K				DTX/S1	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正																																								
1・ドセタキセル 40~50 mg/m <sup>2</sup> DAY1				-	-	-																																									
2・ティーエスワン 80 mg/m <sup>2</sup> DAY1~14 (最大150mg/BODY) (2週間投与 1週間休み)				80~禁30	60~禁150	2.4~禁3																																									
★アルコール含有説明要				Ne基準	HGB基準	PLT基準																																									
21日(3週)1クール				2000	8	75000																																									
				GOT基準	T-Bil基準	Scr基準																																									
				150	3	1.5																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NO</td> <td>薬品1</td> <td>規格</td> <td>本数</td> <td>薬品2(規格本数)</td> <td>時間・投与法</td> </tr> <tr> <td>①</td> <td>デキサート 6.6mg</td> <td></td> <td>1 本</td> <td>生食50mL</td> <td>15分で点滴</td> </tr> <tr> <td></td> <td>グラニセロン「NK」1mg</td> <td></td> <td>1 本</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>ドセタキセル( )mg</td> <td>80mg</td> <td>本</td> <td rowspan="2">▲5%ブドウ糖250mL</td> <td rowspan="2">①デキサート終了後~ 1時間で点滴</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>20mg</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>生食50mL</td> <td></td> <td>1 本</td> <td></td> <td>③ドセタキセル終了後~ 全開で点滴</td> </tr> </table>								NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法	①	デキサート 6.6mg		1 本	生食50mL	15分で点滴		グラニセロン「NK」1mg		1 本			②	ドセタキセル( )mg	80mg	本	▲5%ブドウ糖250mL	①デキサート終了後~ 1時間で点滴			20mg	本	③	生食50mL		1 本		③ドセタキセル終了後~ 全開で点滴						
NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法																																										
①	デキサート 6.6mg		1 本	生食50mL	15分で点滴																																										
	グラニセロン「NK」1mg		1 本																																												
②	ドセタキセル( )mg	80mg	本	▲5%ブドウ糖250mL	①デキサート終了後~ 1時間で点滴																																										
		20mg	本																																												
③	生食50mL		1 本		③ドセタキセル終了後~ 全開で点滴																																										
<b>★DAY1に エスワン配合錠14日分 オーダー必要★</b>																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="8">エスワン配合錠 80mg/m<sup>2</sup>(最大120mg/BODY) 分2</td> </tr> <tr> <td colspan="8">A エスワン配合錠 80mg/BODY (20mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 14日分</td> </tr> <tr> <td colspan="8">④ B エスワン配合錠100mg/BODY (25mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 14日分</td> </tr> <tr> <td colspan="8">C エスワン配合錠120mg/BODY (20mg)6Cap 朝夕食後(3-0-3) 14日分</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align:center;">2週間服用 1週間休み</td> </tr> </table>								エスワン配合錠 80mg/m <sup>2</sup> (最大120mg/BODY) 分2								A エスワン配合錠 80mg/BODY (20mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 14日分								④ B エスワン配合錠100mg/BODY (25mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 14日分								C エスワン配合錠120mg/BODY (20mg)6Cap 朝夕食後(3-0-3) 14日分								2週間服用 1週間休み							
エスワン配合錠 80mg/m <sup>2</sup> (最大120mg/BODY) 分2																																															
A エスワン配合錠 80mg/BODY (20mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 14日分																																															
④ B エスワン配合錠100mg/BODY (25mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 14日分																																															
C エスワン配合錠120mg/BODY (20mg)6Cap 朝夕食後(3-0-3) 14日分																																															
2週間服用 1週間休み																																															
【点滴翌日~RP(浮腫および嘔気予防)】																																															
デカドロン(0.5mg) 8錠 分2(4-4-0) 2日分																																															
ファモチジン(10mg) 2錠 分2(1-0-1) 2日分																																															
2022023訂																																															
月日	指示			指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施																																			
	①~④			DAY1																																											