

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|------|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------|
| NO 7004 | | レジメン名 | | Weekly CBDCA/S1(2-1) | | | |
| 病棟 患者番号 氏名 | | 癌種 | ステージ | PS | クール数 | 指示医師名 | |
| | | | | | | | |
| | | 年齢 | 身長 | 体重 | 体表面積 | GFR (血清ルアチニン値) | |
| | | 歳 | cm | kg | m ² | ml/min (mg/dl) | |
| 【適応がん種】頭頸部K | | | | CBDCA/S1 | CCr補正 | GOT補正 | T-Bil補正 |
| 1・カルボプラチン AUC 0.5 DAY1・8・15 or 100 mg | | | | カルバート使用 | - | - | |
| 2・エスワンタイホウ 80~120 mg/Body DAY1~14 (2週間投与 1週間休み) | | | | 80~禁30 | 60~禁150 | 2.4~禁3 | |
| 21日(3週)1クール | | | | WBC基準 | HGB基準 | PLT基準 | |
| | | | | - | - | - | |
| | | | | 【病状】 | | | |
| | | | | 1 全て説明している | | | |
| | | | | 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない | | | |
| | | | | 3 未告知である | | | |
| | | | | 【治療】 | | | |
| | | | | 1 抗癌剤による治療・予防と説明 | | | |
| | | | | 2 抗癌剤とは言わず治療と説明 | | | |
| | | | | 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 | | | |
| | | | | 4 薬に関しては説明していない | | | |
| | | | | 平成20年8月1日 改訂 | | | |
| NO | 薬品1 | 規格 | 本数 | 薬品2(規格本数) | 時間・投与法 | | |
| ① | グラニセトロン1mg | | 1 本 | 生食50mL | 15分で点滴 | | |
| ② | カルボプラチン()mg | 150mg | 本 | ▲5%ブドウ糖250mL | ①グラニセトロン終了後～1時間で点滴 | | |
| | | 50mg | 本 | | | | |
| ③ | 生食50mL | | 1 本 | | ②カルボプラチン終了後～全開で点滴 | | |
| ④ | A BSA<1.25m ² ・・・エスワンタイホウ 80mg/BODY (20mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 14日分 | | | | | | |
| | B 1.25m ² <BSA<1.5m ² ・・・エスワンタイホウ 100mg/BODY (25mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 14日分 | | | | | | |
| | C BSA>1.5m ² ・・・エスワンタイホウ 120mg/BODY (20mg)6Cap 朝夕食後(3-0-3) 14日分 | | | | | | |
| オーダー(処方箋)で投薬 | | | | 2週間服用 1週間休み | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|-----|-------|----|----|----|----|----|----------|----|----|
| | | | | | | | | | | 202201更新 | | |
| 月日 | 指示 | | | 指示医 | 受け | 監査 | 払い | 払監 | 調製 | 調監 | 前確 | 実施 |
| | | | ①～④ | DAY1 | | | | | | | | |
| | | | ①～③ | DAY8 | | | | | | | | |
| | | | ①～③ | DAY15 | | | | | | | | |