

NO **7005** レジメン名 **FP**

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)	
歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)	

【適応がん種】 頭頸部がん 1・フルオロウラシル 1000 mg/m ² DAY 1~4 2・シスプラチン 80 mg/m ² DAY 1 21日(3週)1クール	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂
	60~禁30	180~ND	3.1~禁5.1	
	30~	-	禁5.1	
	WBC基準	HGB基準	PLT基準	
	2000	8	75000	
	GOT基準	T-Bil基準	Scr基準	
	150	3	1.5	

NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与方法
①	アプレピタント125mg内服(day2~3は80mgを午前中に内服)				
②	パロノセトロンバック		1 本		アプレピタント内服後~全開
③	デキサメタゾン アスパラギン酸カリウム 硫酸マグネシウム	6.6mg	1.5 本 2 本 1 本	デノサリン500mL	パロノセトロン終了後~1時間で点滴
④	マンニトール 300mL		1 本		デキサメタゾン終了後~30分で点滴
⑤	シスプラチン()mg	50mg 25mg 10mg	本 本 本	【生食250mL】	マンニトール終了後~1時間で点滴
⑥	ヴィーンF500mL		1 本		シスプラチン終了後~1時間で点滴
⑦	ヴィーンF500mL		1 本		ヴィーンF終了後~1時間で点滴
⑧	デノサリン500mL		1 本		ヴィーンF終了後~1時間で点滴
⑨	デキサメタゾン	6.6mg	1 本	生食50mL	全開で点滴
⑩	フルオロウラシル()mg	1000mg	本	5%ブドウ糖500mL	24時間持続・ポンプ使用
⑪	生食50mL		1 本		day4治療薬終了後~全開で点滴

月日		①~⑧ ⑩	DAY1	指示医	受け	⑨⑩	製	調監	前確	実施
		① ⑨⑩	DAY2							
		① ⑨⑩	DAY3							
		⑨⑩⑪	DAY4							

医師指示表			
月日	指示事項	指示者名	受領者名
	シスプラチン投与日 1日2回 尿量測定	↓	
	①レジメンの点滴開始からの5時間 ②その後の5時間		
	↓		
	CDDP当日.....上記5時間の尿量が500mL以下の場合ラシックス40mg1錠内服		

★院内セットメニュー 【高度催吐性リスクレジメン】					
	DAY 2~4(翌日から内服)				
	デカドロン(0.5mg)	16錠	分2~分3	3日分	
	アプレピタント(80mg)	1Cap	朝食後	2日分	
	吐気時(必要に応じて処方)				
	メトクロプラミド錠	1回2錠	10回分(1日3回まで)		
備考					
【延期基準】 <input type="checkbox"/> 白血球2000未満・・・好中球1000未満・・・血小板7.5万未満・・・HGB8g未満 <input type="checkbox"/> GOT、GPT150以上・・・T-Bil 3mg/dl以上 <input type="checkbox"/> クレアチニン1.5mg/dl以上					