

No 7007		レジメン名		TPF			
病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
			年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)
			歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)
【適応がん種】 頭頸部がん				CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂
1・フルオロウラシル 750 mg/m ² DAY1~5				60~禁30	180~ND	3.1~禁5.1	
2・シスプラチン 70 mg/m ² DAY1				30~	-	禁5.1	
3・ドセタキセル 60 mg/m ² DAY1				-	-	-	
21日(3週)1クール				WBC基準 2000	HGB基準 8	PLT基準 75000	
				GOT基準 150	T-Bil基準 3	Scr基準 1.5	
No	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与方法		
①	アブレピタント	125mg内服	(day2~3は80mgを午前中に内服)				
②	パロノセトロン	バック	1本		アブレピタント内服後~全開		
③	デキサメタゾン	6.6mg	1.5本	デノサリン500mL	パロノセトロン終了後~1時間で点滴		
③	アスパラギン酸カリウム 硫酸マグネシウム		2本 1本				
④	ドセタキセル()mg	80mg 20mg	本 本	▲5%ブドウ糖500mL	デキサメタゾン終了後~1時間で点滴		
④	マンニトール	300mL	1本		ドセタキセル終了後~30分で点滴		
⑤	シスプラチン()mg	50mg 25mg 10mg	本 本 本	【生食250mL】	マンニトール終了後~1時間で点滴		
⑥	ヴィーンF	500mL	1本		シスプラチン終了後~1時間で点滴		
⑦	ヴィーンF	500mL	1本		ヴィーンF終了後~1時間で点滴		
⑧	デノサリン	500mL	1本		ヴィーンF終了後~1時間で点滴		
⑩	フルオロウラシル()mg	1000mg	本	5%ブドウ糖500mL	24時間持続・ポンプ使用		
⑪	生食	50mL	1本		5FU終了後~全開で点滴		
							202201改訂
月日	うら面オーダー必要		指示医	受け	うら面確認必要		製 調 監 前 確 実施
		①~⑩	DAY1				
		⑩	DAY2				
		⑩	DAY3				
		⑩	DAY4				
		⑩⑪	DAY5				

医師指示表			
月日	指示事項	指示者名	受領者名
	シスプラチン投与日 1日2回 尿量測定		
	①レジメンの点滴開始からの5時間 ②その後の5時間		
	↓		
	CDDP当日.....上記5時間の尿量が500mL以下の場合ラシックス40mg1錠内服		

★院内セットメニュー 【高度催吐性リスクレジメン】			
DAY 2~4(翌日から内服)			
デカドロン(0.5mg)	16錠	分2~分3	3日分
アプレピタント(80mg)	1Cap	朝食後	2日分
吐気時(必要に応じて処方)			
メクロプラミド錠	1回2錠	10回分(1日3回まで)	

<p>【延期基準】</p> <p><input type="checkbox"/>白血球2000未満・・・好中球1000未満・・・血小板7.5万未満・・・HGB8g未満</p> <p><input type="checkbox"/>GOT、GPT150以上・・・T-Bil 3mg/dl以上</p> <p><input type="checkbox"/>クレアチニン1.5mg/dl以上</p>
