

NO 7008 レジメン名		TP								
病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名					
年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)						
歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)						
【適応がん種】 頭頸部がん			CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂				
1・シスプラチン 70 mg/m ² DAY1			30~	-	禁5.1					
2・ドセタキセル 60 mg/m ² DAY1			-	-	-					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TS1の治療歴があるなど毒性を考慮して TPFレジメンからフルオウラシルを省略したレジメン </div>			WBC基準	HGB基準	PLT基準					
21日(3週)1クール			2000	8	75000					
			GOT基準	T-Bil基準	Scr基準					
			150	3	1.5					
NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与方法					
① アブレピタント125mg内服(day2~3は80mgを午前中に内服)										
② パロノセトロンパック		1 本			アブレピタント内服後~全開					
③ デキサメタゾン	6.6mg	1.5 本	デノサリン500mL		パロノセトロン終了後~1時間で点滴					
③ アスパラギン酸カリウム		2 本								
③ 硫酸マグネシウム		1 本								
④ ドセタキセル()mg	80mg	本	▲5%ブドウ糖500mL		デキサメタゾン終了後~1時間で点滴					
	20mg	本								
④ マンニトール 300mL		1 本			ドセタキセル終了後~30分で点滴					
⑤ シスプラチン()mg	50mg	本	【生食250mL】		マンニトール終了後~1時間で点滴					
	25mg	本								
	10mg	本								
⑥ ヴィーンF500mL		1 本			シスプラチン終了後~1時間で点滴					
⑦ ヴィーンF500mL		1 本			ヴィーンF終了後~1時間で点滴					
⑧ デノサリン500mL		1 本			ヴィーンF終了後~1時間で点滴					
うら面オーダー必要		うら面確認必要		202201改訂						
月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①②③④⑤⑥⑦⑧	DAY1								

医師指示表			
月日	指示事項	指示者名	受領者名
	シスプラチン投与日 1日2回 尿量測定		
	①レジメンの点滴開始からの5時間 ②その後の5時間		
	↓		
	CDDP当日.....上記5時間の尿量が500mL以下の場合ラシックス40mg1錠内服		

★院内セットメニュー 【高度催吐性リスクレジメン】			
DAY 2~4(翌日から内服)			
デカドロン(0.5mg)	16錠	分2~分3	3日分
アプレピタント(80mg)	1Cap	朝食後	2日分
吐気時(必要に応じて処方)			
メクロプラミド錠	1回2錠	10回分(1日3回まで)	

<p>【延期基準】</p> <p><input type="checkbox"/>白血球2000未満・・・好中球1000未満・・・血小板7.5万未満・・・HGB8g未満</p> <p><input type="checkbox"/>GOT、GPT150以上・・・T-Bil 3mg/dl以上</p> <p><input type="checkbox"/>クレアチニン1.5mg/dl以上</p>
