

NO **7009** レジメン名 **PTX(weekly)±放射線**

病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
			年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清ルアチン値)
			歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)

【適応がん種】甲状腺未分化がん	PTX	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】
1・パクリタキセル 80 mg/m ² DAY1. 8. 15					1 全て説明している
放射線併用時は30mg/m ²					2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない
★アルコール含有説明要					3 未告知である
28日(4週)1クール					【治療】
					1 抗癌剤による治療・予防と説明
					2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明
					3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明
					4 薬に関しては説明していない
					平成20年7月1日 改訂
	WBC基準	HGB基準	PLT基準		

NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
①	レスタミンコーワ5錠	内服	(前投与 オーダー不要)		②デキサートと同時に内服

②	デキサート 6.6mg		1.5 本	★生食50mL	①レスタミンコーワと同時に15分で点滴
	ファモチジン20mg		1 本		
③	グラニセトロン「NK」1mg		1 本	生食100mL	②デキサート終了後～30分で点滴
④	パクリタキセルNK()mg	100mg	本	▲5%ブドウ糖250mL	③グラニセトロン終了後～1時間で点滴
		30mg	本		
⑤	生食50mL		1 本		④パクリタキセルNK終了後～全開で点滴

【看護師注意事項】○点滴セットはPVCフリー

★13万円/28日1クール ★1時間45分 200807更新

月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①～⑤	DAY1								
	①～⑤	DAY8								
	①～⑤	DAY15								
	放射線併用時は休薬なし	DAY22								