

NO 9003		レジメン名 M-VECs(CBDCA)(裏面指示あり)				
病棟	患者番号	氏名	指示医師名			
年齢	身長	体重	体表面積			
歳	cm	kg	m ²			
【適応がん種】	尿路上皮K	MTX/VLB/EPI/CBDCA	CCr補正 GOT補正 T-Bil補正			
1・メソトレキセート	30 mg/m ²	DAY1. 15. 22	60~禁30 180~ 3.1~禁5.1			
2・エクザール	3 mg/m ²	DAY2. 15. 22	- 60~禁180 1.5~禁3.1			
3・エピルビシン	30 mg/m ²	DAY2	- 60~ 1.2~			
4・カルボプラチン	AUC4	DAY2	カルバート使用 - -			
【カルバートの式: CBDCA量(mg) = (GFR+25) × AUC】		WBC基準 HGB基準 PLT基準	- - -			
28日(4週)1クール						
1	メソトレキセート	30 mg/m ² × m ²	= mg mg/BODY			
2	エクザール	3 mg/m ² × m ²	= mg mg/BODY			
3	エピルビシン	30 mg/m ² × m ²	= mg mg/BODY			
4	カルボプラチン	(GFR+25) × AUC4	mg mg/BODY			
NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法	
①	デキサメタゾン6.6mg		1 本	生食50mL	15分で点滴	
②	メソトレキセート()mg	50mg 5mg	本 本	▲ソルデム1 200mL	デキサート終了後~ 30分で点滴	
③	エクザール()mg	10mg	本	生食50mL	メソトレキセート終了後~ 15分で点滴	
④	ハルトマンPH8 500mL		1 本		②または③終了後~ 2時間30分で点滴	
⑤	ロイコポリン3mg		5 本	5%ブドウ糖50mL	ハルトマン終了後に 全開で点滴	
⑥	アロキンバック		1 本		全開で点滴	
⑦	デキサメタゾン 6.6mg		1.5 本	生食50mL	アロキン終了後~15分で点滴	
⑧	エクザール()mg	10mg	本	生食50mL	デキサート終了後~ 15分で点滴	
⑨	エピルビシン()mg	10mg	本	生食50mL	エクザール終了後~ 15分で点滴	
⑩	カルボプラチン「NK」()mg	450mg 150mg 10mg	本 本 本	5%ブドウ糖500mL	エピルビシン終了後~ 2時間で点滴	
⑪	生食50mL		1 本		カルボプラチン終了後~ 全開で点滴	
★11万円/28日1クール			★4時間/5時間/4時間/4時間			200807更新
月日	うら面オーダー必要		指示医	受け	うら面確認必要	調監 前確 実施
	①②	④⑤	DAY1			
		⑥~⑩	DAY2			
	①②③④⑤		DAY15			
	①②③④⑤		DAY22			

