

NO **9026** レジメン名 **GEM/CBDCA**

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)	
歳	cm	kg	m <sup>2</sup>	ml/min (mg/dl)	

【適応がん種】尿路上皮K	GEM/CBDCA	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成21年2月6日 改訂
1・ゲムシタビン 1000 mg/m <sup>2</sup> DAY1. 8		-	-	-	
2・カルボプラチン AUC5 DAY1 【カルバートの式: CBDCA量(mg) = (GFR+25) × AUC】		カルバート使用	-	-	
21日(3週)1クール		WBC基準 3000	HGB基準 -	PLT基準 100000	

NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
① パロノセトロンバッグ		1 本		
② デキサメタゾン 6.6mg		1 本	生食100mL	30分で点滴
③ デキサメタゾン 6.6mg グラニセトロン 1mg		1 本 1 本	生食100mL	30分で点滴
④ ゲムシタビン( )mg	1000mg 200mg	本 本	5%ブドウ糖100mL	①デキサメタゾン終了後～ 必ず30分で点滴
⑤ カルボプラチン( )mg	450mg 150mg 50mg	本 本 本	▲5%ブドウ糖250mL	②ゲムシタビン終了後～ 1時間で点滴
⑥ 生食50mL		1 本		DAY1③終了後～ DAY8②終了後～ 全開で点滴

【DAY8延期基準】  
□白血球2000未満、血小板75000以下で中止考慮

【減量基準】  
□白血球1000未満、好中球500未満、血小板20000以下で  
CBDCA AUC 5→4~4.5 への減量考慮  
GEM 1000 → 800 mg/m<sup>2</sup> への減量考慮

202201改訂

月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①② ④⑤⑥ DAY1									
	③④ ⑥ DAY8									