

| | | | | | | |
|------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| NO | 9028 | レジメン名 | PTX/CBDCA | | | |
| 病棟 患者番号 氏名 | 癌種 | ステージ | PS | クール数 | 指示医師名 | |
| | | | | | | |
| | 年齢 | 身長 | 体重 | 体表面積 | GFR(血清クレアチニン値) | |
| | 歳 | cm | kg | m² | ml/min (mg/dl) | |
| 【適応がん種】尿路上皮がん | | PTX/CBDCA | CCr補正 | GOT補正 | T-Bil補正 | |
| 1・パクリタキセル 175 mg/m ² DAY1 | | | | | | |
| 2・カルボプラチン AUC5 DAY1 | | | | | | |
| 【カルバートの式: CBDCA量(mg) = (GFR + 25) × AUC】 | | カルバートの式 | | | | |
| ★アルコール含有説明要 | | | | | | |
| 21日(3週)1クール | | WBC基準 | HGB基準 | PLT基準 | | |
| | | 4000 | 8 | 75000 | | |
| | | 【病状】 | | 1 全て説明している | | |
| | | | | 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない | | |
| | | | | 3 未告知である | | |
| | | 【治療】 | | 1 抗癌剤による治療・予防と説明 | | |
| | | | | 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 | | |
| | | | | 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 | | |
| | | | | 4 薬に関しては説明していない | | |
| | | | | 平成21年6月11日 改訂 | | |
| NO 薬品1 | 規格 | 本数 | 薬品2(規格本数) | 時間・投与法 | | |
| ① レスタミンコーワ錠5錠 内服 (前投与 オーダー不要) | | | | ②と同時に内服 | | |
| ② デキサメタゾン 6.6mg | | 3 本 | 生食50mL | ①と同時に | | |
| ③ ファモチジン20mg | | 1 本 | | 15分で点滴 | | |
| ④ パロノセトロンバッグ | | 1 本 | | ②デキサメタゾン終了後～ | | |
| | | | | 30分で点滴 | | |
| ④ パクリタキセル ()mg | 100mg | 本 | 5%ブドウ糖500mL | ③パロノセトロン終了後～ | | |
| | 30mg | 本 | | 3時間で点滴 | | |
| ⑤ カルボプラチン ()mg | 450mg | 本 | 5%ブドウ糖500mL | ④パクリタキセル終了後～ | | |
| | 150mg | 本 | | 1時間30分で点滴 | | |
| | 50mg | 本 | | | | |
| ⑥ 生食50mL | | 1 本 | | ⑤カルボプラチン終了後～ | | |
| | | | | 全開で点滴 | | |
| 【看護師注意事項】 | | | | | | |
| ○点滴セットはJMS社製JY-PFC341F7を使用 | | | | | | |
| 202201改訂 | | | | | | |
| 月日 | 指示 | 指示医 | 受け | 監査 | 払い | |
| | | | | | | |
| | ①②③④⑤⑥ | DAY1 | | | | |
| | | | | | | |