

NO 9031		レジメン名		CPT-11/CDDP							
病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名				
			年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)				
			歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)				
【適応がん種】陰茎がん(適応外)				CPT-11/CDDP		CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月11日 改訂		
1・イリノテカン		60 mg/m ²	DAY1. 8. 15	60~	-	-					
2・シスプラチン		60 mg/m ²	DAY1	60~禁30	180~	3.1~禁5.1					
28日(4週)1クール				WBC基準	HGB基準	PLT基準					
				3000	-	100000					
NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与法					
①	アプレピタント 125mg					内服					
②	パロノセトロンバック		1 本			①内服後～全開					
③	デキサメタゾン 6.6mg		1.5 本	デノサリン500mL		1時間で点滴					
	アスパラギン酸カリウム 硫酸マグネシウム		2 本 1 本								
④	イリノテカン()mg	100mg 40mg	本 本	5%ブドウ糖500mL		デキサメタゾン終了後～ 1時間30分で点滴					
⑤	マンニトール 300mL		1 本			イリノテカン終了後～ 30分で点滴					
⑥	シスプラチン()mg	50mg	本	【生食250mL】		マンニトール終了後～ 1時間で点滴					
		25mg	本								
		10mg	本								
⑦	ヴィーンF500mL		1 本			シスプラチン終了後～ 1時間で点滴					
⑧	ヴィーンF500mL		1 本			ヴィーンF終了後～ 1時間で点滴					
⑨	デノサリン500mL		1 本			ヴィーンF終了後～ 1時間で点滴					
⑩	パロノセトロンバック		1 本			全開で点滴					
⑪	デキサメタゾン 6.6mg		1 本	生食50mL		15分で点滴					
⑫	イリノテカン()mg	100mg	本	生食500mL		パロノセトロン終了後～ 1時間30分で点滴					
		40mg	本								
⑬	生食50mL		1 本			イリノテカン終了後～ 15分で点滴					
202201改訂											
月日	うら面オーダー必要			指示医	受け	うら面確認必要		製	調監	前確	実施
			①～⑨	DAY1							
			⑩～⑬	DAY8							
			⑩～⑬	DAY15							

医師指示表			
月日	指示事項	指示者名	受領者名
	シスプラチン投与日 1日2回 尿量測定	↓	
	①レジメンの点滴開始からの5時間 ②その後の5時間		
	↓		
	CDDP当日.....上記5時間の尿量が500mL以下の場合ラシックス40mg1錠内服		

★院内セットメニュー 【高度催吐性リスクレジメン】				
DAY 2~4(翌日から内服)				
デカドロン(0.5mg)	16錠	毎食後(朝6-昼6-夕4)	3日分	
アプレピタント(80mg)	1Cap	朝食後	2日分	
吐気時(必要に応じて処方)				
プリンペラン錠	1回2錠	10回分(1日3回まで)		