

NO 9033 レジメン名 TIP【陰茎癌】(裏面指示あり)

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)	
歳	cm	kg	m <sup>2</sup>	ml/min (mg/dl)	

【適応がん種】精巣腫瘍	PAC/CDDP/IFM	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	(病状) 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である (治療) 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂
1・パクリタキセル 175 mg/m <sup>2</sup> DAY1					
2・シスプラチン 25 mg/m <sup>2</sup> DAY 1~3		60~禁30	180~	3.1~禁5.1	
3・イホマイド 1200 mg/m <sup>2</sup> DAY 1~3 (ウロミテキサン1回 400 mg/BODY ×3回 DAY1~3) (または 240 mg/m <sup>2</sup> ×3回 DAY1~3)		60~	180~	3.1~禁5.1	
21日(3週)1クール		WBC基準	HGB基準	PLT基準	

NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
①	レスタミンコーワ5錠	内服 (前投与 オーダー不要)		②デキサメタゾンと同時に内服

②	デキサメタゾン 6.6mg ファモチジン20mg		3本 1本	★生食50mL	①レスタミンコーワと同時に15分で点滴
③	グラニセトロン「NK」1mg		1本	生食100mL	②デキサメタゾン終了後~30分で点滴
④	パクリタキセル( )mg	100mg 30mg	本 本	生食500mL	③グラニセトロン終了後~3時間で点滴
⑤	イメンド125mg内服(day2~3は80mgを午前中に内服)				
⑥	デキサメタゾン 6.6mg グラニセトロン「NK」1mg		1本 1本	生食50mL	15分で点滴
⑦	ハルトマンPH8 500mL		1本		1時間で点滴
⑧	ウロミテキサン( )mg	400mg 100mg	本 本	5%ブドウ糖50mL	ハルトマン終了後~全開で
⑨	イホマイド( )mg	1000mg	本	5%ブドウ糖500mL	ハルトマン終了後⑧と同時~側・1時間30分で点滴
⑩	アスパラギン酸カリウム 硫酸マグネシウム		2本 1本	ハルトマンPH8 500mL	⑨イホマイド終了後~1時間で点滴
⑪	マンニトール 300mL		1本		⑩ハルトマン終了後~30分で点滴
⑫	シスプラチン( )mg	50mg 10mg	本 本	【生食250mL】	マンニトール終了後~1時間で点滴
⑬	ウロミテキサン( )mg	400mg 100mg	本 本	5%ブドウ糖50mL	⑫シスプラチン終了後~全開で
⑭	ハルトマンPH8 500mL		1本		⑬ウロミテキサン終了後4時間で点滴
⑮	ウロミテキサン( )mg	400mg 100mg	本 本	5%ブドウ糖50mL	⑭ハルトマン終了後~全開で

月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①~⑤⑦~⑮	DAY1								
	⑤~⑮	DAY2								
	⑤~⑮	DAY3								

医師指示表			
月日	指示事項	指示者名	受領者名
	シスプラチン投与日 1日2回 尿量測定		
	①レジメンの点滴開始からの5時間 ②その後の5時間		
	↓		
	CDDP当日……………上記5時間の尿量が500mL以下の場合ラシックス40mg1錠内服		