

NO 9034		レジメン名		TPF 陰茎癌(裏面あり)								
病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名					
			年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)					
			歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)					
【適応がん種】 陰茎がん			PAC/CDDP/5-FU		CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂				
1・パクリタキセル 120 mg/m ² DAY1					60~禁30	180~ND	3.1~禁5.1					
2・シスプラチン 50 mg/m ² DAY1					30~	-	禁5.1					
3・フルオロウラシル 1000 mg/m ² DAY2~5					-	-	-					
21日(3週)1クール					WBC基準	HGB基準	PLT基準					
					2000	8	75000					
					GOT基準	T-Bil基準	Scr基準					
					150	3	1.5					
NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法							
①	Day1;イメンド125mg内服・レスタミンコーワ錠5錠			Day2~3;イメンド80mg内服								
②	アロキシバック		1 本		イメンド内服後~全開で							
③	デキサート6.6mg ファモチジン		2 本 1 本	生食50mL	アロキシ終了後15分で							
④	アスパラギン酸カリウム 硫酸マグネシウム		2 本 1 本	デノサリン500mL	デキサート終了後1時間で 点滴							
⑤	パクリタキセル()mg	100mg 30mg	本 本	▲5%ブドウ糖500mL	デノサリン終了後~ 2時間で点滴							
⑥	マンニトール 300mL		1 本		パクリタキセル終了後~ 30分で点滴							
⑦	シスプラチン()mg	50mg 25mg 10mg	本 本 本	【生食250mL】	マンニトール終了後~ 1時間で点滴							
⑧	ヴィーンF500mL		1 本		シスプラチン終了後~ 1時間で点滴							
⑨	ヴィーンF500mL		1 本		ヴィーンF終了後~ 1時間で点滴							
⑩	デノサリン500mL		1 本		ヴィーンF終了後~ 1時間で点滴							
⑪	デキサート 6.6mg		1 本	生食50mL	15分で点滴							
⑫	フルオロウラシル()mg	1000mg	本	5%ブドウ糖500mL	24時間持続・ポンプ使用							
⑬	生食50mL		1 本		フルオロウラシル終了後~ 全開で点滴							
★21日1クール				★5日間		201705更新						
月日	指示			指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
			①~⑩	DAY1								
			① ⑪⑫	DAY2								
			① ⑪⑫	DAY3								
			⑪⑫	DAY4								
			⑫⑬	DAY5								

医師指示表			
月日	指示事項	指示者名	受領者名
	シスプラチン投与日 1日2回 尿量測定		
	①レジメンの点滴開始からの5時間 ②その後の5時間		
	↓		
	CDDP当日……………上記5時間の尿量が500mL以下の場合ラシックス40mg1錠内服		

	吐気時(必要に応じて処方)		
	プリンペラン錠 1回2錠 10回分(1日3回まで)		

備考	
【延期基準】	
<input type="checkbox"/> 白血球2000未満…好中球1000未満…血小板7.5万未満…HGB8g未満 <input type="checkbox"/> GOT、GPT150以上…T-Bil 3mg/dl以上 <input type="checkbox"/> クレアチニン1.5mg/dl以上	