

NO **9046** レジメン名 **GEM/CDGP(裏面指示あり)**

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
	年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)
	歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)

【適応がん種】尿路上皮がん	GEM/CDGP	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成21年1月6日 改訂
1・ゲムシタビン 1000 mg/m ² DAY1,8,15		-	-	-	
2・ネダプラチン 70 mg/m ² DAY2		60～禁30	180～	3.1～禁5.1	
28日(4週)1クール		WBC基準	HGB基準	PLT基準	
		3000	-	100,000	

NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
①	デキサメタゾン 6.6mg グラニセトロン 1mg		1 本 1 本	生食50mL	15分で点滴
②	ゲムシタビン()mg	1000mg 200mg	本 本	5%ブドウ糖100mL	30分で点滴
③	生食50mL		1 本		②ゲムシタビン終了後～全開で点滴
④	アプレピタント125mg内服(day2～3は80mgを午前中に内服)				
⑤	パロノセトロンバック		1 本		アプレピタント内服後～全開
⑥	デキサメタゾン	6.6mg	1.5 本	デノサリン500mL	パロノセトロン終了後～1時間で点滴
⑦	マンニトール 300mL		1 本		デキサメタゾン終了後～30分で点滴
⑧	アクプラ()mg	100mg 50mg 10mg	本 本 本	【生食500mL】	マンニトール終了後～1時間で点滴
⑨	ヴィーンF500mL		1 本		アクプラ終了後～1時間で点滴

月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①②③	DAY1								
	④～⑨	DAY2								
	①②③	DAY8								
	①②③	DAY15								

DAY 3～5(CDDP翌日から内服)										
アプレピタント(80mg)	1Cap	朝食後	2日分							
吐気時(必要に応じて処方)										
デカドロン(0.5mg)	8錠	分2～分3	3日分							
メクロプラミド錠	1回2錠	10回分(1日3回まで)								