

NO 9047		レジメン名		Pembro+アキシチニブ								
病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名					
						~						
	年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)							
	歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)							
【適応がん種】腎細胞癌		Pembro/アキシチニブ		CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 改訂					
1・ペムブロリズマブ 200 mg/body DAY1				-	-	-						
2・アキシチニブ 10 mg/body DAY1~21												
21日(3週)1クール				WBC基準	HGB基準	PLT基準						
NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与法						
①	生理食塩水		1 本	50mL		15分						
②	キイトルーダ()	200mg	1 本	★生食100mL		30分で点滴						
③	生理食塩水		1 本	50mL		15分						
【延期基準】				【注意事項】 Infusion reaction Grade2の場合 本剤の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。 Grade 3以上の場合又は再発性のGrade 2の場合 本剤を直ちに中止し、再投与しない。								
【看護師注意事項】 インラインフィルター(0.2~5μm)を使用すること。												
202201更新												
月日	指示			指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
			①~③	DAY1								