

NO 9041		レジメン名 ペムブロリズマブ(キイトルーダ点滴静注)								
病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名					
				~						
	年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)					
	歳	cm	kg	m <sup>2</sup>	ml/min (mg/dl)					
尿路上皮癌 【適応がん種】 MSI-Hを有する固形癌 頭頸部癌 1・ペムブロリズマブ 200 Body DAY1 (キイトルーダ点滴静注)		ペムブロリズマブ	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 改訂				
21日(3週)1クール			WBC基準	HGB基準	PLT基準					
			-	-	-					
NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与法					
① 生理食塩水		1 本	50mL		15分					
② キイトルーダ( )	200mg	1本	★生食100mL		30分で点滴					
③ 生理食塩水		1 本	50mL		15分					
【延期基準】			【注意事項】 Infusion reaction Grade2の場合 本剤の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。 Grade 3以上の場合又は再発性のGrade 2の場合 本剤を直ちに中止し、再投与しない。							
【看護師注意事項】 インラインフィルター(0.2~5μ m)を使用すること。										
クール数( )										
			★60分							
月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①~③	DAY1								