

NO **4069** レジメン名 **XELOX**

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
				~	
年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)	
歳	cm	kg	m <sup>2</sup>	ml/min (mg/dl)	

【適応がん種】Colon K、MK	I-OHP/Cape	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成22年1月7日 改訂
1・オキサリプラチン <b>130 mg/m<sup>2</sup></b> DAY1		-	-	-	
2・ゼローダ (下記参照) DAY1~14		Ccr60-40-20(50-35-25%)	50減量, 30禁	2.5倍以下 1.5倍以下	
		-	-	-	
21日(3週)1クール		WBC基準	HGB基準	PLT基準	
		3000	9	100000	
		T-Bil	Scr	GOT/GPT/ALP	
		施設基準値の1.5倍以下	2.5倍以下	2.5倍以下	

NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
① アロキシバック		1 本		全開で点滴
② デキサメタゾン 6.6mg		1 本	★5%ブドウ糖50mL	主・15分で点滴
③ オキサリプラチン( )mg	100mg	本	▲5%ブドウ糖250mL	デキサメタゾン終了後~ 2時間で点滴
	50mg	本		
④ 5%ブドウ糖50mL		1 本		オキサリプラチン終了後~ 全開で点滴

**★DAY1に ゼローダカプセル14日分 オーダー必要★**

ゼローダ 2000mg/m<sup>2</sup>(端数切捨て) 分2 14日分

A・ BSA1.36未満.....ゼローダ(300mg) 2400mg/BODY/DAY 8錠 分2 朝夕食後 14日分

⑤ B・ BSA1.36-1.66.....ゼローダ(300mg) 3000mg/BODY/DAY 10錠 分2 朝夕食後 14日分

C・ BSA1.67-1.96.....ゼローダ(300mg) 3600mg/BODY/DAY 12錠 分2 朝夕食後 14日分

**2週間服用 1週間休み**

★24万円/21日1クール	★約2時間15分	201505更新
月日	指示	指示医 受け 監査 払い 払監 調製 調監 前確 実施
	①②③④⑤ DAY1 内服14日→	

内服終了後7日間以上 間隔をあける！！

★24万円/21日1クール	★約2時間15分	201505更新
月日	指示	指示医 受け 監査 払い 払監 調製 調監 前確 実施
	①②③④⑤ DAY1 内服14日→	

内服終了後7日間以上 間隔をあける！！

★24万円/21日1クール	★約2時間15分	201505更新
月日	指示	指示医 受け 監査 払い 払監 調製 調監 前確 実施
	①②③④⑤ DAY1 内服14日→	

内服終了後7日間以上 間隔をあける！！