

NO **4087** レジメン名 **Pmab-IRIS (ColonK) ★内服14日★**

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
				~	
	年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)
	歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)

【適応がん種】Colon K	CPT-11/S1	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂
1・パニツムマブ 6 mg/kg DAY1. 15		60~	-	-	
2・イリノテカン 100~125 mg/m ² DAY1. 15		60~	-	-	
3・ティーエスワン 80 mg/m ² DAY1~14 (最大120mg/BODY) (2週間投与 2週間休み)		80~禁30	60~禁150	2.4~禁3	
		WBC基準	HGB基準	PLT基準	
		3000	8	100000	
		GOT基準	T-Bil基準	Scr基準	
		150	3	1.5	

28日(4週)1クール	NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
	① ベクティビックス()mg	400mg 100mg	本 本	生食100mL	1時間で点滴 (1000mg以上は90分)
	② 生食50mL		1 本		ベクティビックス終了後~ 10分で点滴
	③ デキサメタゾン 6.6mg グラニセトロン「NK」1mg		1 本 1 本	生食50mL	15分で点滴
	④ イリノテカン()mg	100mg 40mg	本 本	5%ブドウ糖500mL	グラニセトロン終了後~ 1時間30分で点滴
	⑤ 生食50mL		1 本		イリノテカン終了後~ 全開で点滴

★DAY1に TS1カプセル14日分 オーダー必要★

	TS-1 80mg/m ² (最大120mg/BODY) 分2 14日分(2週間服用 2週間休み)
⑥	A ティエスワン 80mg/BODY (20mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 14日分
	B ティエスワン100mg/BODY (25mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 14日分
	C ティエスワン120mg/BODY (20mg)6Cap 朝夕食後(3-0-3) 14日分

クール数()

★13万円/28日1クール

★1時間45分

200807更新

月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①~⑥ DAY1	内服14日→								
	休み DAY8									
	①~⑤ DAY15									
	休み DAY22									

クール数()

月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①~⑥ DAY1	内服14日→								
	休み DAY8									
	①~⑤ DAY15									
	休み DAY22									