

NO **4136** レジメン名 **SOX**

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
				~	
年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)	
歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)	

【適応がん種】MK	I-OHP/TS-1	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成27年5月28日 改訂
1・オキサリプラチン 100 mg/m ² DAY1		-	-	-	
2・TS-1 (下記参照) DAY1~14		Ccr60-40-20(50-35-25%)	50減量, 30禁	2.5倍以下	
		-	-	1.5倍以下	
21日(3週)1クール		WBC基準	HGB基準	PLT基準	
		3000	9	100000	
		T-Bil	Scr	GOT/GPT/ALP	
		施設基準値の1.5倍以下	2.5倍以下		

NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
① アロキシバック		1 本		全開で点滴
② デキサメタゾン 6.6mg		1 本	★5%ブドウ糖50mL	主・15分で点滴
③ オキサリプラチン()mg	100mg	本	▲5%ブドウ糖250mL	デキサメタゾン終了後～ 2時間で点滴
	50mg	本		
④ 5%ブドウ糖50mL		1 本		オキサリプラチン終了後～ 全開で点滴

★DAY1に TS-1 14日分 オーダー必要★

TS-1 80-120mg/BODY 分2 14日分.....併用可能

⑤ A・ BSA1.25未満.....ティエスワン 80mg/BODY (20mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 14日分

B・ BSA1.25-1.5.....ティエスワン100mg/BODY (25mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 14日分

C・ BSA1.5以上.....ティエスワン120mg/BODY (20mg)6Cap 朝夕食後(3-0-3) 14日分

2週間服用 1週間休み

月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施	201505更新
	①②③④⑤ DAY1 内服14日→										

内服終了後7日間以上 間隔をあける！！

月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施	201505更新
	①②③④⑤ DAY1 内服14日→										

内服終了後7日間以上 間隔をあける！！

月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施	201505更新
	①②③④⑤ DAY1 内服14日→										

内服終了後7日間以上 間隔をあける！！