

NO 4038		レジメン名 AC★翌日から3日内服★	
病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS
		~	
年齢	身長	体重	体表面積
歳	cm	kg	m ²
【適応がん種】MMK ADM/CPA			GFR(血清クレアチニン値)
1・アドリアシン (50~)60 mg/m ² DAY1			ml/min
2・エンドキサン (500~)600 mg/m ² DAY1			(mg/dl)
21-28日(3-4週)1クール			
NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数) 時間・投与法
① イメンド125mg内服			
② アロキシバック		1 本	全開で点滴
③ デキサメタゾン	6.6mg	1 本	★生食50mL アロキシ終了後 15分で点滴
④ ドキソルビシン()mg	50mg	本	★5%ブドウ糖50mL ①デキサメタゾン終了後~ 主管より15分で点滴
	10mg	本	
⑤ エンドキサン()mg	500mg	本	②ドキソルビシン終了後~ 側管より1時間で点滴
	100mg	本	
⑥ 生食50mL		1 本	③エンドキサン終了後~ 主管より全開で点滴
★翌日(DAY2)から オーダー必要★			
点滴翌日-RP			
1・ デカドロン(0.5mg)	16錠	分2(6-6-4)	3日分
2・ イメンド80mg	1C	分1	2日分
★4万円/21~28日1クール		★1時間30分	
月日	指示	指示医	受け 監査 払い 払監 調製 調監 前確 実施
	①②③④⑤⑥	翌日から3日→	
月日	指示	指示医	受け 監査 払い 払監 調製 調監 前確 実施
	①②③④⑤⑥	翌日から3日→	
月日	指示	指示医	受け 監査 払い 払監 調製 調監 前確 実施
	①②③④⑤⑥	翌日から3日→	