| NO 4095 レジメンタ | | | FOLFIRINOX | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|---|------------|---|---|
| 病棟 患者番号 氏名 | 癌種 | Д- | テージ | PS | <i>7</i> | 一ル数 | 指示医師名 |
| | 年齢 | 身 | Ę. | 体重 | 体 | 表面積 | GFR(血清クレアチニン値) |
| | | 表 | | cm | kg | | m [*] ml/mi |
| 【適応がん種 膵がん IーLV/Iー(| DHP/CPT-1 | 1/5F | -U/5I | FU CCr補正 G | OT補正 T | -Bil補正 เ | 「mg/d |
| 1・レボホリナート 200 mg/m ² | DAY1 | | | | - | 1 2 | 全て説明している 病名は説明しているが、詳しい 状については説明していない |
| 2・オキサリプラチン 85 mg/m | | | | Ccr60-40-2 | 0 (50-35-2 | 5%) 3 | 状については説明していない 未告知である |
| 3・イリノテカン 180 mg/㎡ 4・フルオロウラシル Bolus 400 mg/㎡ | | | | 60~ - 30~ - | | * Б 1 | 治療】 抗癌剤による治療・予防と説明 |
| | | | | | | 2 | 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 |
| 5・フルオロウラシル 持続 1200 mg/㎡ | DAYI. 2 | | | 30~ - Ne基準 H | | *5.1 ₃ LT基準 ₄ | 抗癌剤とは言わず予防薬と説! 薬に関しては説明していない |
| 14日(2週)1クール ∞薬品1 | 規格 | 本数 | | 薬品2(規格本数 | 下記参照 | 時間·投与 | 法 |
| ① イメンド内服 (Day1 ; 125m _i | | | | | | 薬局払 | |
| 2 アロキシバック | | 1 | 本 | | | 全開で点滴 | |
| ③ デキサメタゾン6.6mg | | 1 | 本 | ★生食50mL | | アロキシ 15分で | ン終了後 ・占海 |
| 2 L | 100mg | | 本 | 本 ▲5%ブドウ糖250m | | デキサッ | <u> </u> |
| ④オキサリプラチン()m | 50mg | | 本 | | | <u>主·2時</u> | 間で点滴 |
| § ブスコパン | | 1 | 本 | ★生食50m | ıL | | 7後~レポホリナートと同時 分で点滴 |
| | 100mg | | 本 | 生食500mL | | | <u>゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚</u> |
| ⑥カンプト() m | g 40mg | | 本 | | | 主•1時 | 間30分で点滴 |
| プレボホリナート()m | 100mg | | 本 | ▲5%ブドウ糖250mL | | オキサリフ | ラチン終了後~ |
| プレボホリナート()m | 25mg | | 本 | | | <u>側・2時</u> | 間で点滴 |
| 8 フルオロウラシル Bolus()m | 1000mg | □ 木 □ | | ★5%ブドウ糖50mL | | レボホリ | ナート終了後~ |
| , | 250mg | g | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | <u> 主・全開で投与</u> フルオロウラシル Bolus終了後^ | |
| 9 フルオロウラシル 持続()mg | 1000mg | | 本 | ソルデム3A500mL | | 主-23 | 時間で持続点流 |
| | 250mg | | | | | ポンプ使用!! | |
| ⑩デキサメタゾン6.6mg | | 1 | 本 | ★生食50m | ıL | 全開で | |
| 【適正投与】 ①PS O~1 ②65歳未満 ③T-B | il 1. 2未満 ○ | 4下 | 痢を認 | はめない ⑤好中 | 球2000以 | 上 ⑥血小 | 、板10万以上 |
| ⑥UGT1A1遺伝子多型をもたない→ホ 【慎重投与】 | ₹E(UGT1A1* | 6/*6 | , UGT | 1A1*28/*28)また | :は、ダブル | ヘテロ(UGT | 「1A1*6/*28)接合体 |
| ①PS 0~1 ②65歳以上 ③T-B | | | | | | | |
| ⑥UGT1A1遺伝子多型をもつ→ホモ 【禁忌】 | (UGITAT*6/ | *6. l | JGT1/ | (1*28/*28)また | は、ダフル・ | ヘテロ(UG) | 1A1*6/*28/接合1 |
| ①PS 2以上 ③T-Bil 1. 8以上 (漏 | | | | <mark>未満 ⑥血小板</mark> 11を優先して減 | | 茜 | |
| 投与レベル L-OHP | CP | PT−1 | | フルオロウラシル bc | lus フルオロ | | |
| Level-0 85 Level-1 65 | | 180 150 | | 400 中止 | | 1200 900 | 200 200 |
| Level-2 50 | | 120 1120 | | 中正 | | 600 | 200 |
| Level−3 | | Р Т | | <u>中止</u> ★約50時 | 間 | 中止 | 中止 |
| 指示 | | ○ | | | きけ 監査 払 | い 払監 調 | ■製 調監 前確 実施 |
| 1/1/2/2// | 56780 | 9) | DA' | Y 1 | | | |
| 0204 | | | | | | - | |