

NO **9028** レジメン名 **PAC/CBDCA**

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)	
歳	cm	kg	m <sup>2</sup>	ml/min (mg/dl)	

【適応がん種】 尿路上皮がん	PAC/CBDCA	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成21年6月11日 改訂
1・パクリタキセル 175 mg/m <sup>2</sup> DAY1					
2・カルボプラチン AUC5 DAY1 【カルバートの式: CBDCA量(mg) = (GFR+25) × AUC】		カルバートの式			
★アルコール含有説明要					
21日(3週)1クール		WBC基準 4000	HGB基準 8	PLT基準 75000	

1 パクリタキセルNK 175 mg/m <sup>2</sup> × m <sup>2</sup> = mg	mg/BODY
2 カルボプラチン ( +25) × = mg	mg/BODY

NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
①	レスタミンコーワ5錠	内服	(前投与 オーダー不要)		②デキサメタゾンと同時に内服

②	デキサメタゾン 6.6mg ファモチジン20mg		3 本 1 本	★生食50mL	①レスタミンコーワと同時に15分で点滴
③	アロキシバック		1 本		②デキサメタゾン終了後～30分で点滴
④	パクリタキセルNK( )mg	100mg 30mg	本 本	生食500mL	③アロキシ終了後～3時間で点滴

⑤	カルボプラチン( )mg	450mg 150mg 50mg	本 本 本	▲5%ブドウ糖250mL	④パクリタキセル終了後～1時間で点滴
⑥	生食50mL		1 本		⑤カルボプラチン終了後～全開で点滴

【看護師注意事項】  
 ○点滴セットはJMS社製JY-PFC341F7を使用  
 ○特にパクリタキセルNKはアナフィラキシーショック等過敏症の多い薬剤であることに留意する。  
 またその過敏症は初回投与に最も頻度が高く、投与開始10分以内に好発することが知られている。  
 (添付文書上の記載……投与開始1時間は頻回にバイタルサインのモニタリングを行う等、患者の状態を十分観察する)

★17万円/21日1クール		★4時間45分		201009更新										
月日	うら面備考あり	指示		指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施		
		①～⑥	DAY1											
		休み(検血を考慮)	DAY8											
		休み(検血を考慮)	DAY15											