


NO 2019	レジメン名	ベルケイド(2コース目以降)									
病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名						
	年齢 歳	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>	GFR(血清クリアチニン値) ml/min (mg/dl)						
【適応がん種】多発性骨髓腫						ボルテゾミブ	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】	
1・ベルケイド 1.3 mg/m <sup>2</sup> DAY1・4・8・11						-	-	-		1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である	
( 9コースからはDAY1・8・15・22投与 35日1クールでの投与可能 )										【治療】	
21日(3週)1クール						WBC基準 1000	HGB基準 6.5	PLT基準 25000		1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない	
						Ne基準 500				平成20年8月18日 登録	
NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法							
①デキサメタゾン( 16.5 )mg	6.6mg	2.5 本	生食100mL	30分で点滴							
②ベルケイド( )mg	3mg	本	生食20mL 0.06本 【生食 1.2mL】	①終了後に 腹部または大腿部に皮下注							



ベルケイド投与部位は腹部が望ましい(左図参照)

Day1⇒1、Day4⇒8、Day8⇒2、Day11⇒7

注射部位に痒み、痛みが認められる場合は  
リンデロンVG軟膏を考慮する。

※腹部に皮下注射した場合に比べて太ももに注射した方が注射部位の反応強く出る傾向があると報告されています。

★69万円/21日1クール			★30分								200808更新	
月日	指示		指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施	
	①②	DAY1										
	①	DAY2										
	①②	DAY4										
	①	DAY5										
	①②	DAY8										
	①	DAY9										
	①②	DAY11										
	①	DAY12										