

NO 1039		レジメン名 PAC(Weekly)/CBDCA																			
病棟 患者番号 氏名			癌種		ステージ		PS		クール数		指示医師名										
			年齢		身長		体重		体表面積		GFR(血清クレアチニン値)										
			歳		cm		kg		m ²		ml/min										
											(mg/dl)										
【適応がん種】NSCLC												PAC/CBDCA		CCr補正		GOT補正		T-Bil補正		【病状】	
1・パクリタキセル 70 mg/m ² DAY1. 8. 15																		1 全て説明している			
2・カルボプラチン AUC6 DAY1												カルバート使用						2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない			
【カルバート式の式: CBDCA量(mg)=(GFR+25)×AUC】																		3 未告知である			
★アルコール含有説明要												WBC基準		HGB基準		PLT基準		【治療】			
28日(4週)1クール																		1 抗癌剤による治療・予防と説明			
																		2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明			
																		3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明			
																		4 薬に關しては説明していない			
																		平成20年8月1日 改訂			
NO 薬品1			規格		本数		薬品2(規格本数)			時間・投与法											
① レスタミンコーワ5錠 内服 (前投与 オーダー不要)										② デキサメタゾンと同時に内服											
②			DAY1→		3 本		★生食50mL			①レスタミンコーワと同時に15分で点滴											
			DAY8. 15→		1.5 本																
			ファモチジン20mg		1 本																
③			グラニセトロン「NK」1mg (day1はアロキシバック)		1 本		生食100mL			②デキサメタゾン終了後～30分で点滴											
④			パクリタキセルNK()mg		100mg		本		▲5%ブドウ糖250mL			③グラニセトロン終了後～1時間で点滴									
					30mg		本														
⑤			カルボプラチン「NK」()mg		450mg		本		5%ブドウ糖500mL			④パクリタキセル終了後～1時間30分で点滴									
					150mg		本														
					50mg		本														
⑥			生食50mL		1 本					④パクリタキセル又は⑤カルボプラチン終了後～全開で点滴											
【看護師注意事項】																					
○点滴セットはJMS社製JY-PFC341F7を使用																					
★19万円/28日1クール										★3時間15分/1時間45分/1時間45分					200807更新						
月日			指示				指示医 受け 監査 払い 払監 調製 調監 前確 実施														
			①②③④⑤⑥ DAY1																		
			①②③④ ⑥ DAY8																		
			①②③④ ⑥ DAY15																		
			休み DAY22																		